

25.04.2018

Адвокат® для котів
(краплі для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:
імідаклоприд – 100 мг;
моксідектин – 10 мг.

Допоміжні речовини: бензиловий спирт, бутилгідрокситолуен (Е 321), пропілен карбонат.

Фармакологічна дія

ATC vet: QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування (QP54AB02 - моксідектин, QP53AX17 - імідаклоприд)

Адвокат® для котів – це екто- і ендопаразитоцид зовнішнього застосування. Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин.

Імідаклоприд – ектопаразитоцид, належить до групи хлорнікотинілових сполук. Він перериває передачу нервового імпульсу у паразита, що в подальшому призводить до його паралічу та загибелі. Імідаклоприд практично не впливає на ЦНС ссавців.

Моксідектин належить до другого покоління макроциклічних лактонів групи мільбеміцинів. Діюча речовина проявляє вплив проти багатьох ендо- і ектопаразитів. Моксідектин взаємодіє з гама-аміно-масляною кислотою та з глутаровими хлорними каналцями паразитів. Внаслідок чого відбувається незворотне зниження м'язової активності, параліч та загибель паразитів.

Фармакокінетика

Після зовнішнього застосування імідаклоприд поширюється по всій поверхні тіла тварини впродовж однієї доби. Моксідектин абсорбується через шкіру і розповсюджується системно, досягаючи максимальної концентрації в плазмі крові через 1-2 доби. Моксідектин виводиться з організму повільно протягом 1 місяця.

Застосування

Лікування та профілактика котів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*); лікування отодектозу (*Otodectes cynotis*) та нотоедрозу (*Notoedres cati*); лікування кишечних (*Toxocara cati* і *Ancylostoma tubaeforme*) і легеневих (*Eucolleus aerophilus* / syn. *Capillaria aerophila*) нематодозів; профілактика дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*: мікродирофілярії L3 та L4 стадії).

Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.

Показання до застосування котам	Лікування	Профілактика
Сифонаптерози: блохи <i>Ctenocephalides felis</i>	✓	✓
Акарози: отодектоз (<i>Otodectes cynotis</i>), нотоедроз (<i>Notoedres cati</i>)	✓	
Аскаридатози: <i>Toxocara cati</i> (личинки L4 стадії, молоді та статевозрілі нематоди)	✓	
Стронгілятози: <i>Ancylostoma tubaeforme</i> (личинки L4 стадії, молоді та статевозрілі нематоди)	✓	
Трихуратози органів дихання: <i>Eucolleus aerophilus</i> / syn. <i>Capillaria aerophila</i> (статевозрілі)	✓	
Філяріатози: дирофілярії <i>Dirofilaria immitis</i> (мікродирофілярії L3 та L4 стадії)		✓

Лікування та профілактика тхорів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*), а також профілактика дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*: мікродирофілярії L3 та L4 стадії).

Дозування

Мінімальна рекомендована доза імідаклоприду - 10 мг/кг маси тіла, моксідектину - 1,0 мг/кг маси тіла, що еквівалентно 0,1 мл Адвокату® для котів на 1 кг маси тіла тварини.

Схема дозування Адвокату® для котів та тхорів:

Маса тіла тварин (кг)	Розмір піпетки	Об'єм, (мл)	Імідаклоприд (мг/кг маси тіла)	Моксідектин (мг/кг маси тіла)
≤ 4 кг	Адвокат® для маленьких котів та тхорів	0,4	Мінімум 10	Мінімум 1
> 4 - 8 кг	Адвокат® для великих котів	0,8	10-20	1-2
> 8 кг	Відповідна комбінація піпеток			

Коти:

Лікування та профілактика сифонаптерозу (ураження блохами)

Одноразова обробка попереджає зараження блохами впродовж 4-х тижнів. Доцільно поєднувати обробку тварини препаратом Адвокат® для котів з обробкою місць перебування тварин з метою переривання життєвого циклу бліх. При лікуванні алергічного блошиного дерматиту препарат рекомендується застосовувати щомісяця.

Лікування отодектозу

Одноразове застосування. Можлива повторна обробка через 30 діб. Не наносити препарат безпосередньо у вушний канал.

Лікування нотоедрозу

Одноразове застосування.

Лікування та профілактика кишечних і легеневих нематодозів

Щомісячна обробка тварин препаратом знижує можливість зараження нематодами. Препарат також використовують у період профілактичного карантинування (за результатами дослідження проб калу), при планових та сезонних дегельмінтизаціях котів проти кишечних та легеневих нематодозів.

Профілактика дирофіляріозу

Препарат застосовують за 1 місяць до очікуваної активності кровосисних комах, впродовж усього періоду активності та ще місяць після завершення їхньої активності, або протягом усього року. Обробку тварин рекомендується проводити щомісяця в один і той же день. Якщо тварині застосовували інший препарат, який захищає від мікродирофілярій, Адвокат® для котів можна застосовувати через 1 місяць після обробки попереднім препаратом.

Тхорі:

Лікування та профілактика сифонаптерозу (ураження блохами)

Застосування препарату попереджає зараження блохами впродовж 3-х тижнів. При високій активності бліх у зовнішньому середовищі рекомендується повторна обробка через 2 тижні.

Профілактика дирофіляріозу

Препарат застосовують за місяць до очікуваної активності кровосисних комах, впродовж усього періоду активності та ще місяць після завершення їхньої активності, або впродовж усього року. Обробку тварин рекомендується проводити щомісяця в один і той же день.

25.04.2018

Спосіб застосування



Препарат застосовують лише зовнішньо. Взяти одну піпетку з упакування. Тримаючи піпетку у вертикальному положенні, відкрутити і зняти ковпачок. Далі перевернути ковпачок, одягнути його на піпетку, і відкрити видаливши фольгу.

У ділянці шиї біля основи черепа розділити шерсть тварини, щоб видно було шкіру. Розмістити кінець піпетки на шкіру, міцно стиснути піпетку декілька разів, нанести весь вміст безпосередньо на шкіру. Наносити препарат на непошкоджену шкіру.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з гіперчутливістю до складників препарату.

Для котів: кошенятам віком до 9-ти тижнів; застосування препарату тваринам масою тіла до 1 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування.

Для тхорів: не застосовувати препарат Адвокат[®] для котів фасуванням для великих котів (0,8 мл), або препарат Адвокат[®] для собак. Лікування тварин масою тіла до 0,8 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування.

Не використовувати для лікування канарок.

Застереження

Часте застосування шампуню може зменшити ефективність препарату. Купання тварин 1-2 рази у період між щомісячними обробками тварин препаратом Адвокат[®] для котів не впливає на ефективність препарату.

Ефективність препарату Адвокат[®] для котів не тестувалась на тхорах масою тіла більше 2 кг, тому тривалість дії препарату може бути меншою у цих тварин.

Часте та повторне використання екто- і ендопаразитоцидів будь-якого класу може привести до виникнення резистентності до діючої речовини. Використання препаратів має бути призначене після проведення оцінки доцільності призначення препарату.

Препарат не досліджувався на вагітних та лактуючих тваринах.

Лабораторні дослідження імідаклоприду та моксідектину на щурах та кроликах не дали тератогенних, фетотоксичних або матково-токсичних ефектів.

Використовувати тільки після призначення ветеринарним лікарем.

Лікування котів масою тіла до 1 кг та тхорів до 0,8 кг повинно базуватися на оцінці ризику вигоди.

Існує обмежений досвід використання продукту хворим та ослабленим тваринам, тому лікування повинно базуватися на оцінці ризику вигоди.

Не допускати потрапляння препарату в очі та до ротової порожнини тварин. Не дозволяти щойно обробленим тваринам облизувати одне одного.

Оскільки використання препарату тваринам, ураженим дорослими дирофіляріями, може привести до серйозних побічних наслідків, включаючи загибел тварини, то перед застосуванням препарату необхідно провести діагностику котів та тхорів віком старше 6 місяців на дирофіляріоз (статевозрілі паразити). Якщо діагноз підтверджується, то тварин необхідно лікувати щодо дирофіляріозу згідно з листівкою препарату (п. дозування).

Під час обробки тварин не можна палити, пити і приймати їжу.

Уникати попадання препарату на шкіру, в очі, у ротову порожнину. При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки або очі необхідно ретельно промити їх проточною

25.04.2018

водою. Якщо подразнення шкіри або очей не проходить, або препарат випадково був заковтнутий, необхідно звернутися до лікаря і показати листівку-вкладку або етикетку препарату.

Після роботи з препаратом необхідно ретельно вимити руки.

Люди із гіперчутливістю до складників препарату Адвокат® для котів повинні наносити препарат з обережністю.

Після застосування препарату у котів можливий короткосчасний свербіж, у рідких випадках спостерігають еритему, ознаки засалювання шерсті, блювоту. Ці прояви швидко минають без лікування.

У тварин, які випадково злизали препарат відразу після нанесення, можуть виникнути ознаки первових розладів (атаксія, генералізований тремор, розширення зіниць, нистагми), порушення дихання, посилене слиновиділення та блювота. Ці ознаки зникають через декілька хвилин без додаткового лікування.

Продукт гіркий на смак, тому салівація, що виникає після злизування препарату, не є ознакою інтоксикації і зникає через декілька хвилин без лікування. Правильне нанесення препарату мінімізує можливість злизування препарату.

В дуже рідких випадках застосування препарату може стати причиною тимчасових змін у поведінці тварини, таких як млявість, збудження та відсутність апетиту.

Після застосування препарату не можна стригти тварин до повного висихання препарату на шкірі. Розчинник, що входить до складу Адвокату® для котів, може залишати плями та псувати такі матеріали як шкіра, тканини, пластик та інші. Якщо тварини утримуються у квартирі і мають доступ до меблів, то після обробки їх необхідно утримувати окремо до повного висихання препарату на шкірі.

Не допускати щойно оброблених тварин облизувати себе та одне одного.

Форма випуску

Піпетки по 0,4 та 0,8 мл запаковані в блістери по 3, 4, 6, 21 або 42 штуки. Пакувальний матеріал: білі поліпропіленові туби з ковпачками.

Зберігання

Зберігати препарат у закритому упакуванні виробника в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °C.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Байєр Енімал Хелс ГмбХ ,
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH
D-51368, Leverkusen, Germany

Виробник продукту:

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
Проєнсдорфер стр. 324 , D-24106 Кіль,
Німеччина

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
D-24106 Kiel
Germany