

КІЛТІКС®
(нашийник)
листівка-вкладка

Опис

Поліхлорвініловий нашійник жовтого кольору.

Склад

Кожен грам нашійника містять діючі речовини (мг):

пропоксур - 100;

флуметрин - 22,5.

Допоміжні речовини: дибутіл адипат, пропіленгліколь октаноат деканоат, сосва олія, стеаринова кислота, двоокис титану (Е 171), заліза оксид, полівінілхлорид.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC55, флкетрин, комбінації).

Діючі речовини нашійника виявляють синергічну дію на паразитоформні кліщі (*Rhipicephalus spp.*, *Ixodes Ricinus*, *Dermacentor spp*) та блохи (*Ctenocephalides canis/felis*, *Pulex irritans*), у собак.

Пропоксур – ектопаразитицид, діє на паразита, як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого настає загибель ектопаразитів (бліх та кліщів).

Флуметрин – ектопаразитицид синтетичної групи піретроїдів, має високу акарицидну активність. Синтетичні піретроїди взаємодіють з натрієвими каналцями мембран нервових клітин, викликають загибель ектопаразитів внаслідок деполаризації нервових закінчень. Флуметрин має швидку дію на бліх, проявляє також репелентну дію щодо комах.

Фармакокінетика

Обидва активних компоненти постійно виділяються з нашійника.

Комбінація пропоксуру та флуметрину в значній мірі підсилює ефективність проти кліщів та бліх, у порівнянні до їх окремого використання.

Дермальна резорбція обох активних компонентів не спостерігається в значних кількостях. Дермальне DL₅₀ було визначене >5000 мг/кг (кролі). Клінічні, гематологічні, біохімічні показники (включаючи холінестеразу), а також показники сечі, які були отримані при вивченні впливу дії нашійника на тварин, також не відхилялися від норми.

Застосування

Профілактика та лікування собак при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides canis/felis*, *Pulex irritans*) та паразитоформними кліщами (*Ixodes ricinus*, *Dermatocentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*).

Дозування

Для великих порід собак - нашійник довжиною 66 см (45 г), для середніх порід собак - 48 см (30,2 г), для дрібних порід собак – 35 см (12,5 г). Нашійник одягається навколо шиї собаки.

Після відкриття упакування нашійник розгортають, видаляють тонкі пластикові перегородки на внутрішній стороні і вільно закріплюють навколо шиї собаки таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався проміжок у 2 пальці, потім заціпають пряжкою. Нашійник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Підігнаний належним чином нашійник у закріпленому стані повинен вільно рухатися.

Постійне використання нашійника Кілтікс® для середніх та великих собак забезпечує захист тварини від ектопаразитів протягом 7 місяців, для маленьких собак – 6 місяців. Тривалість і рівень захисту залежить від довжини, густоти та стану шерсті тварини, також від ступеню ураження ектопаразитами. При зниженні ефективності дії нашійника

07.07.2020

його необхідно замінити на новий. Перед купанням тварин нашійник необхідно знімати. Значне зволоження шерсті і шкіри тварини (дощ, купання, плавання) знижують ефективність нашійника.

Примітка

Разом із обробкою тварин проти ектопаразитів, необхідно періодично чистити, мити і обробляти відповідними засобами місця перебування тварин (кошки для тварин, підстилки, місця відпочинку тварин, предмети догляду за тваринами тощо).

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з ознаками ураження шкіри!

Не застосовувати хворим та ослабленим тваринам!

Не використовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до діючих речовин нашійника (пропоксуру, флуметрину)!

Застереження

При роботі з нашійником дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Після контакту з нашійником необхідно ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Не допускати контакту тварин з нашійником Кілтікс® з маленькими дітьми.

Люди з гіперчутливістю до компонентів нашійника повинні уникати контакту з ним.

Невикористаний препарат та упакування утилізують відповідно до національних вимог.

Нашійник (діючі речовини) є токсичним для бджіл, риби та інших водних організмів.

Форма випуску

Поліхлорвініловий нашійник у герметичному упакуванні упакований в картону коробку.

Для великих порід собак – 66 см (45,0 г), середніх порід собак – 48 см (30,2 г), для дрібних порід собак – довжиною 35 см (12,5 г).

Зберігання

Зберігати препарат у закритому упакуванні виробника, в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 5⁰С до 25⁰С.

Термін придатності:

5 років. Після відкриття упакування нашійник треба одразу використовувати.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Байер Енімал Хелс ГмбХ, D-51368
Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH, D-51368
Leverkusen, Germany

Виробник готового продукту:

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
Проенсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,
Німеччина

KVP Pharma + Veterinar-Product, GmbH,
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Germany