

30.09.2020

**Больфо® нашийник
(нашийник)
листівка–вкладка**

Опис

Поліхлорвініловий нашийник жовтого кольору.

Склад

10,0 г маси нашийника (поліхлорвінілова стрічка) містять діючу речовину:
пропоксур - 0,98 г.

Допоміжні речовини: поліхлорвінілова стрічка (дібутил адіпат, пропіленгліколь октаноат деканат, епоксидована соєва олія, стеаринова кислота, діоксид титану, гідрат оксиду заліза, оксид заліза (ІІ), оксид заліза (ІІІ), полівінілхлорид).

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AE02, пропоксур)

Діюча речовина препарату, пропоксур, діє на ектопаразитів як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого наступає їх загибель (бліх, кліщів, вошів та ін.). Для ссавців пропоксур нетоксичний.

Застосування

Профілактика та лікування собак та котів при ектопаразитарних захворюваннях, викликаних блохами (*Ctenocephalides spp.*) і кліщами (*Ixodidae ricinus*).

Дозування

На тварину застосовують один нашийник. Відкривають упакування, нашийник розгортають, видаляють тонкі пластикові перегородки на внутрішній стороні і фіксують на шиї тварини таким чином, щоб між шисю та нашийником залишався невеликий проміжок (у два пальці). Нашийник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Підігнаний належним чином нашийник у закріпленому стані повинен вільно рухатися. У перші кілька днів перевіряйте стан шкіри тварини в області шиї і чи нашийник правильно зафікований (чи не за туго закріплений).

Для великих собак – нашийник довжиною 66 см (вага 45г) і вмістом пропоксуру 4,442 г.

Для котів та малих собак – нашийник довжиною 35 см (вага 12,5 г) і вмістом пропоксуру 1,23 г.

Постійне використання нашийника забезпечує захист тварини від бліх до 4 місяців, від кліщів до - 10 тижнів.

Ефективність дії нашийника та тривалість захисту залежать від довжини та стану шерсті, інтенсивності інвазії. Тварин зі скуювдженю та брудною шерстю перед застосуванням нашийника купають із шампунем. Рекомендують періодично обробляти підстилки та засоби догляду за тваринами інсектицидним аерозолем Больфо®.

Больфо® нашийник застосовують тваринам з 3 місячного віку.

Протипоказання

Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, а також тваринам чутливим до складників препарату!

Не застосовувати тваринам із захворюваннями шкіри та ушкодженнями шкірного покриву!

Не застосовувати кошенятам на цуценятам до 3 місячного віку!

Застереження

Не використовувати нашийник самкам в останні тижні вагітності та під час лактації!

Відкривати упакування з нашийником безпосередньо перед використанням. При підвищенні індивідуальній чутливості власника тварини до пропоксуру (ДР) уникати контакту з нашийником. Одягати нашийник тварині лише у гумових рукавицях. Після маніпуляцій з нашийником ретельно вимити руки. Тварин з нашийником не підпускати до маленьких дітей.

Під час фіксації нашийника тварині, не можна палити, пити, приймати їжу.

Вагітні жінки (третій триместр) повинні уникати контакту з нашийником.

30.09.2020

Форма випуску

Поліхлорінілова смужка:

для великих собак - нашийник довжиною 66 см (вага 45 г) і вмістом пропоксуру 4,442 г;

для котів та малих собак – нашийник довжиною 35 см, (вага 12,5 г) і вмістом пропоксуру 1,23 г.

Кожен нашийник загорнутий в алюмінієву фольгу і запакований у картонну коробку.

Зберігання

Зберігають в упакуванні виробника у сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від кормів та продуктів при температурі від 0 до 30 °C.

Термін придатності

5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байєр Енімал Хелс ГмбХ

D-51368, Леверкузен, Німеччина

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

Проєнсдорфер Стр. 324,

D-24106 Кіль, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH

D-51368, Leverkusen, Germany

KVP Pharma und Veterinar Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324,

D-24106 Kiel, Germany