

3 0. 0 9. 2020

**Больфо® спрей**  
**(розчин для зовнішнього застосування, спрей)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Розчин зі слабким специфічним запахом.

**Склад**

100 мл препарату містять діючу речовину:

пропоксур – 0,25 г.

Допоміжні речовини: 2-пропанол, безводна лимонна кислота, пропан, бутан.

**Фармакологічні властивості**

**ATCvet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди і репеленти (QP53AE02, пропоксур)**

Діюча речовина препарату, пропоксур, діє на ектопаразитів як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого настає загибель ектопаразитів (блох, іксодових кліщів тощо). Для ссавців пропоксур не токсичний.

**Застосування**

Профілактика та лікування собак і котів при ектопаразитарних захворюваннях, викликаних блохами (*Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*) та іксодовими кліщами (родина *Ixodidae*).

**Дозування**

Препарат Больфо® спрей застосовують зовнішньо.

Перед застосуванням флакон струшують і, натискаючи на розпилювач, впродовж декількох секунд, скеровують струмінь препарату з відстані 30-40 см на тулуб тварини проти росту шерсті до її легкого зволоження. Прикриваючи очі тварини, обробляють вушні раковини і грудину, далі кінчиками пальців втирають препарат на шерсть навколо очей і носа, після чого обприскують шию, тулуб, кінцівки і хвіст. При обробці тварин препаратом уникають попадання препарату а очі та ніс.

Препарат Больфо® спрей знищує бліх та кліщів миттєво після нанесення. Загиблих після обробки кліщів, які залишилися прикріпленими до шкіри тварин, видаляють механічно. Тварин, які утримуються разом, рекомендують обробляти одночасно проти бліх.

Молодих тварин обробляють препаратом з 3 місячного віку.

Місця перебування тварин, підстилки, килимки та інші засоби догляду за тваринами рекомендують періодично обробляти відповідними інсектицидами.

**Протипоказання**

Не застосовувати хворим і ослабленим тваринам, а також тваринам чутливим до складників препарату!

Не застосовувати кошенятам на цуценятам до 3-х місячного віку!

Не застосовувати тваринам із ушкодженням шкіри!

Не застосовувати продуктивним тваринам!

**Застереження**

Не застосовувати самкам під час лактації та в останні місяці вагітності!

Препарат застосовують зовнішньо. Не розпилювати препарат біля відкритого вогню та гарячих відкритих поверхонь! Не користуватися пошкодженим балоном! Не вдихати препарат!

Обробку тварин проводять на повітрі або у добре вентиляованих приміщеннях. Використання спрею може призвести до вибуху суміші газів, тому не можна використовувати його надмірно, особливо, у маленьких закритих приміщеннях. Після обробки препаратом тваринам не дозволяють купатися у відкритих водоймах впродовж 3-х діб.

Після роботи з препаратом руки ретельно миють, а приміщення, у якому обробляли тварин, добре провітрюють.

Люди з гіперчутливістю до пропоксуру повинні уникати контакту з препаратом.

**Форма випуску**

Бляшаний або алюмінієвий флакон об'ємом 250 мл. Клапан спрею міститься у трубці.

30.09.2020

**Зберігання**

Препарат зберігають в герметичному упакованні виробника у сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від кормів та продуктів при температурі від 0 до 30 °С. Уникати прямих сонячних променів при зберіганні.

Не заморожувати!

Не зберігати в холодильнику!

**Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

Байер Енімал Хелс ГмбХ  
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH  
D-51368, Leverkusen, Germany

**Виробник готового продукту**

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ  
Проєнсдорфер Стр. 324,  
D-24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma und Veterinar Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324,  
D-24106 Kiel, Germany