

24.11.2020

**ФРОНТЛАЙН СПРЕЙ**  
(розчин для зовнішнього застосування, спрей)  
листівка-вкладка

**Опис**

Безбарвний прозорий розчин.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину:

фіпроніл - 2,5 мг.

Допоміжні речовини: коповідон, ізопропанол, вода дистильована.

**Фармакологічні властивості**

**АТС-vet QP53, ектопаразициди, інсектициди і репеленти (QP53AX15 – фіпроніл)**

Препарат - контактний інсектоакарицидний розчин для зовнішнього застосування.

Фіпроніл, який входить до складу препарату, похідний піразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл накопичується в волосяних цибулинах і жирових залозах та не впливає на центральну нервову систему тварин.

Препарат ефективний проти кліщів до 5 тижнів, проти бліх – від 1-го до 3-х місяців, проти вошей – до 63 діб у собак та до 42 діб для котів.

**Застосування**

Профілактика та лікування собак і котів при ураженні ектопаразитами: паразитиформними кліщами (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*), блохами (*Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), вошами (*Linognathus setosus*).

Профілактика та лікування собак і котів при блошиному алергічному дерматиті.

**Дозування**

Препарат застосовують собакам та котам зовнішньо, шляхом розпилення на тіло тварини.

**Дозування:** доза препарату становить 3-6 мл на кг маси тіла тварини (7,5 – 15 мг фіпронілу на кг маси тіла), що відповідає 2–4 натисканням на кг маси тіла для флаконів ємністю 250 та 500 мл або 6-12 натисканням для флаконів ємністю 100 мл.

**Спосіб застосування:** розпилювати препарат на всю поверхню тіла тварини з відстані 10 – 20 см, проти росту шерсті; у довгошерстих тварин рекомендується розчісувати шерсть щіткою, щоб препарат міг потрапити на шкіру; для обробки голови та ділянки навколо очей препарат наносять на руку у рукавиці і обережно втирають у шерсть тварини.

Після обробки препарат повинен висохнути на тілі тварини. Не висушувати препарат за допомогою рушників.

Мінімальний інтервал між застосуванням становить 4 тижні.

**Протипоказання**

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам при гіперчутливості до компонентів препарату!

Не застосовувати тваринам віком до 2 діб!

Не застосовувати для кролів!

**Застереження**

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

При обробці тварин препаратом користуватися гумовими рукавицями.

Уникати попадання препарату на шкіру або в очі, не вдихати препарат.

При випадковому потрапленні препарату на шкіру або слизові оболонки необхідно відразу промити їх великою кількістю води.

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.

Забороняється пити, приймати їжу і палити під час роботи з препаратом.

24.11.2020

Після обробки тварин не гладити тварин та уникати контакту маленьких дітей з обробленими тваринами до повного висихання препарату.

Особам, чутливим до діючих речовин препарату, уникати прямого контакту з ним.

**Форма випуску**

Флакони з поліетилену високої щільності з механічною помпою для розпилення по 100, 250 та 500 мл.

**Зберігання**

Зберігати препарат в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей і тварин місці, за температури від 2 до 30 °С.

**Термін придатності**

36 місяців.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

Берінгер Інгельхайм Ветмедіка ГмбХ,  
55216 м.Інгельхайм-на-Рейні, Німеччина.

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,  
55216 Ingelheim-am-Rhein, Germany.

**Виробник готового продукту**

Берінгер Інгельхайм Енімал Хелс Франс  
СКС, 4 шема дю Калке - 31300 Тулуза,  
Франція.

Boehringer Ingelheim Animal Health France  
SCS, 4 chemin du Calquet - 31300 Toulouse,  
France.