

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Фронтлайн Комбо для котів

2. Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

фіпроніл – 10 г;

(S)-метопрен – 12 г.

Допоміжні речовини: бутилгідроксианізол, бутилгідрокситолуол, етанол, полісорбат 80, полівідон, диетиленгліколь моноетилефір.

3. Фармацевтична (лікарська) форма

Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення.

4. Фармакологічні властивості

ATC vet QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування. QP53AX65 – фіпроніл, комбінації.

Препарат Фронтлайн Комбо для котів – контактний інсекто-акарицидний розчин для зовнішнього застосування.

Фіпроніл, який входить до складу препарату, похідний фенілпіразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему теплокровних тварин.

(S)-метопрен імітує дію ювенільного гормону і викликає порушення розвитку та смерть бліх на стадіях яйця і личинки. S-метопрен проникає в оболонку щойно відкладених яєць, а також у личинки та лялечки і блокує їх розвиток, запобігаючи появі статевозрілих комах.

Після нанесення препарату на шкіру активні компоненти поступово розподіляються по всій поверхні тіла тварини, кумулюються в епідермісі, волосяних цибулинах і сальних залозах, і поступово вивільняючись забезпечують тривалий захист тварини від ектопаразитів. Після обробки котів препаратом, блохи (*Ctenocephalides spp*) гинуть протягом 24 годин; кліщі (*Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis campanulata*) та волосоїди (*Felicola subrostratus*) протягом 48 годин.

Одноразова обробка забезпечує захист від кліщів – до 4 тижнів, проти статевозрілих та преімагінальних фаз розвитку комах – до 6 тижнів.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коти, тхори.

5.2 Показання до застосування

Коти

Профілактика та лікування котів при ураженнях блохами (*Ctenocephalides spp.*), кліщами (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) та волосоїдами (*Felicola subrostratus*).

Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні блошиного алергічного дерматиту котів, а також з метою запобігання прикріплення та розвитку ектопаразитів.

Тхори

Профілактика та лікування тхорів при ураженнях блохами (*Ctenocephalides spp.*), кліщами (*Ixodes ricinus*), а також з метою запобігання прикріплення та розвитку ектопаразитів.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати кошенятам віком до 8 тижнів та/або масою тіла до 1 кг.

Не застосовувати тхорам віком до 6 місяців.

Не застосовувати для кролів, оскільки можлива загибель тварини.

5.4 Побічна дія

При злизуванні тваринами препарату зі шкіри після оброблення може виникнути короткочасна гіперсалівація.

В окремих випадках у місцях нанесення препарату можуть спостерігатися подразнення такі, як зміна кольору шкіри, випадіння шерсті, свербіж, почервоніння, які самостійно проходять.

У дуже рідких випадках після застосування препарату спостерігається гіперсалівація, реверсивні неврологічні симптоми (гіпертензія, депресія, перезбудження), блювота та ускладнене дихання. У таких випадках препарат змивають і проводять симптоматичну терапію.

5.5 Особливі застереження при використанні

При нанесенні препарату уникати попадання його в очі тварині та на слизові оболонки.

Не застосовувати перорально, чи будь-яким іншим шляхом крім зовнішнього застосування (нанесення на шкіру).

Наносити лише на суху шкіру у місця недоступні для злизування твариною.

Не рекомендується мити та купати оброблену препаратом тварину впродовж 48 годин після обробки.

При застосуванні препарату не порушувати схему його застосування, це призводить до зниження ефективності. У випадку пропуску чергової обробки її необхідно провести якомога скоріше у тій же дозі.

5.6 Використання під час вагітності та лактації

Застережень немає.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не відома.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат застосовують котам та тхорам зовнішньо шляхом одноразового нанесення на суху непошкоджену шкіру у дозі: одна піпетка 0,5 мл на одну тварину.

Перед обробкою взяти піпетку вертикально, зламати її кінчик, розділити шерсть тварини і видавити вміст піпетки безпосередньо на шкіру у ділянку шиї перед лопатками.

Обробку тварин проти паразитів рекомендується проводити 1 раз на 4 тижні.

Одна обробка забезпечує захист котів та тхорів від кліщів - до 4 тижнів, проти всіх стадій розвитку комах (блохи, волосоїди) – до 6 тижнів.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Передозування препарату у 5 разів більше від рекомендованої дози не викликає симптомів передозування.

5.10 Спеціальні застереження

Після обробки тварин препаратом не допускати злизування препарату (одягають захисний комірць, намордник, фіксують щелепи допоміжними засобами).

Не слід купати тварин протягом 48 годин після обробки препаратом, а також наносити препарат на вологу або пошкоджену шкіру.

Для досягнення максимального захисту тварин рекомендується періодично чистити і обробляти дозволеними засобами предмети догляду та місця перебування тварин (підстилки, килими, м'які меблі тощо).

5.11 Період виведення (каренція)

Не визначається для непродуктивних тварин.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При обробці тварин препаратом користуватися гумовими рукавицями.

Уникати попадання препарату на відкриті ділянки шкіри, в очі, не вдихати препарат.

При випадковому потрапленні препарату на шкіру або слизові оболонки необхідно відразу промити їх великою кількістю води.

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.

Забороняється пити, приймати їжу і палити під час роботи з препаратом.

Після обробки тварин не гладити їх та не допускати контакту маленьких дітей з обробленими тваринами до повного висихання препарату.

Особам, чутливим до діючих речовин препарату, уникати прямого контакту з ним.

У разі випадкового потрапляння препарату в організм людини, необхідно негайно звернутись за медичною допомогою і показати лікарю листівку-вкладку або етикетку препарату.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не відомі.

6.2 Термін придатності

36 місяців.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати препарат в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей і тварин місці при температурі від 2 до 30 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Поліетиленові піпетки об'ємом 0,5 мл, розфасовані по 1, 3 або 4 піпетки в блістери, упаковані в картонні коробки.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористані залишки препарату повинні бути утилізовані у відповідності з національними вимогами.

7. Назва і місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Берінгер Інгельхайм Ветмедіка ГмбХ,
55216 м.Інгельхайм-на-Рейні, Німеччина.

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
55216 Ingelheim-am-Rhein, Germany.

8. Назва і місцезнаходження виробника

Берінгер Інгельхайм Енімал Хелс Франс
СКС, 4 шема дю Калке – 31300 Тулуза,
Франція.

Boehringer Ingelheim Animal Health France
SCS, 4 chemin du Calquet - 31 300 Toulouse,
France.

9. Додаткова інформація

Відсутня.