SENTRY (Сентрі) краплі від бліх, кліщів і комарів для собак

SENTRY

Антипаразитарні краплі **TM SENTRY** містять піретроїди – інсектициди контактної дії, які вбивають бліх, кліщів та комарів безпосередньо при контакті, а не під час укусу. Піретроїди справляють на комах відлякуючий ефект.

Краплі **TM SENTRY** не тільки вбивають бліх, але і припиняють цикл їхнього розвитку за допомогою запатентованого регулятора росту комах (піріпроксифену), який ефективно знищує яйця і личинки бліх.

Активні інгредієнти: Перметрин – 45%, Піріпроксифен – 1,9%, решта інгредієнтів – 53,1%

Дістаньте піпетки з упаковки. Ножицями відріжте кінчик піпетки, направивши її у протилежний бік від обличчя. Утримуйте тварину однією рукою, другою рукою нанесіть розчин. Переверніть піпетку, вузьким кінцем розділіть шерсть і нанесіть вміст однієї піпетки на шкіру тварини у вигляді плями або лінії від основи голови до лопаток, для собак великих порід – до основи хвоста. Утримуйте тварину до повного всмоктування розчину.

Дозування для собак:

- для собак вагою до 7 кг піпетка 1 мл
- для собак вагою 7–15 кг піпетка 1,5 мл
- для собак вагою 15–30 кг піпетка 3 мл
- для собак вагою більше 30 кг піпетка 4,5 мл

Після завершення процедури загорніть піпетку в папір і викиньте.

Правила експлуатації. Не використовуйте продукт частіше одного разу на місяць. Продукт призначений тільки для собак та цуценят віком від 12 тижнів. Не застосовувати для кішок або інших тварин. Не купайте вихованця протягом 12 годин з моменту нанесення крапель. Якщо у Вас є інші тварини, ізолюйте обробленого собаку і не дозволяйте іншим вилизувати його до остаточного висихання розчину.

Тільки для собак. Тільки для зовнішнього застосування. Не застосовувати для цуценят віком до 3-х місяців. Перед застосуванням даного продукту на ослаблених, старих, хворих, вагітних і годуючих тваринах проконсультуйтесь з ветеринаром. Тварина може мати підвищену чутливість до будь-якого продукту, що містить пестициди. Помітивши ознаки прояву підвищеної чутливості, ретельно викупайте вихованця в теплій воді з милом. Якщо симптоми не зникнуть, проконсультуйтесь з ветеринаром. Симптоми чутливості до продукту можуть проявлятися у вигляді почервоніння шкіри, висипу, знебарвлення і випадання шерсті в місці нанесення препарату. Також у собак може відзначатися млявість. Деякі ліки не сумісні з інсектицидами. Перед застосуванням продукту на тварині, яка приймає медикаменти, проконсультуйтесь з ветеринаром.

Увага! Може викликати подразнення слизової оболонки очей середньої тяжкості. Уникайте контакту з очима та одягом. Уникайте потрапляння продукту в очі і пащу тварини. Після застосування крапель, перед їжею, питвом, курінням і т.д., ретельно вимийте руки водою з милом.

Перша допомога при попаданні в очі. Утримуйте очі у відкритому стані і промивайте водою протягом 15–20 хвилин. Якщо Ви носите контактні лінзи, зніміть їх у перші 5 хвилин і продовжуйте промивання. Зверніться до лікаря або в токсикологічний центр для подальшого лікування. Покажіть лікарю упаковку продукту.

Зберігання та утилізація. Діставайте піпетку з упаковки тільки безпосередньо перед застосуванням. Зберігайте в прохолодному (до 25°С) сухому місці, недоступному для дітей. Забороняється заморожувати. Не використовуйте та не зберігайте продукт у безпосередній близькості від опалювальних приладів і відкритого вогню. Не піддавайте впливу прямого сонячного світла.

SENTRY (Сентрі) краплі від бліх, кліщів і комарів для собак

SENTRY

Антипаразитарні краплі **TM SENTRY** містять піретроїди – інсектициди контактної дії, які вбивають бліх, кліщів та комарів безпосередньо при контакті, а не під час укусу. Піретроїди справляють на комах відлякуючий ефект.

Краплі **TM SENTRY** не тільки вбивають бліх, але і припиняють цикл їхнього розвитку за допомогою запатентованого регулятора росту комах (піріпроксифену), який ефективно знищує яйця і личинки бліх.

Активні інгредієнти: Перметрин – 45%, Піріпроксифен – 1,9%, решта інгредієнтів – 53,1%

Дістаньте піпетки з упаковки. Ножицями відріжте кінчик піпетки, направивши її у протилежний бік від обличчя. Утримуйте тварину однією рукою, другою рукою нанесіть розчин. Переверніть піпетку, вузьким кінцем розділіть шерсть і нанесіть вміст однієї піпетки на шкіру тварини у вигляді плями або лінії від основи голови до лопаток, для собак великих порід – до основи хвоста. Утримуйте тварину до повного всмоктування розчину.

Дозування для собак:

- для собак вагою до 7 кг піпетка 1 мл
- для собак вагою 7–15 кг піпетка 1,5 мл
- для собак вагою 15–30 кг піпетка 3 мл
- для собак вагою більше 30 кг піпетка 4,5 мл

Після завершення процедури загорніть піпетку в папір і викиньте.

Правила експлуатації. Не використовуйте продукт частіше одного разу на місяць. Продукт призначений тільки для собак та цуценят віком від 12 тижнів. Не застосовувати для кішок або інших тварин. Не купайте вихованця протягом 12 годин з моменту нанесення крапель. Якщо у Вас є інші тварини, ізолюйте обробленого собаку і не дозволяйте іншим вилизувати його до остаточного висихання розчину.

Тільки для собак. Тільки для зовнішнього застосування. Не застосовувати для цуценят віком до 3-х місяців. Перед застосуванням даного продукту на ослаблених, старих, хворих, вагітних і годуючих тваринах проконсультуйтесь з ветеринаром. Тварина може мати підвищену чутливість до будь-якого продукту, що містить пестициди. Помітивши ознаки прояву підвищеної чутливості, ретельно викупайте вихованця в теплій воді з милом. Якщо симптоми не зникнуть, проконсультуйтесь з ветеринаром. Симптоми чутливості до продукту можуть проявлятися у вигляді почервоніння шкіри, висипу, знебарвлення і випадання шерсті в місці нанесення препарату. Також у собак може відзначатися млявість. Деякі ліки не сумісні з інсектицидами. Перед застосуванням продукту на тварині, яка приймає медикаменти, проконсультуйтесь з ветеринаром.

Увага! Може викликати подразнення слизової оболонки очей середньої тяжкості. Уникайте контакту з очима та одягом. Уникайте потрапляння продукту в очі і пащу тварини. Після застосування крапель, перед їжею, питвом, курінням і т.д., ретельно вимийте руки водою з милом.

Перша допомога при попаданні в очі. Утримуйте очі у відкритому стані і промивайте водою протягом 15–20 хвилин. Якщо Ви носите контактні лінзи, зніміть їх у перші 5 хвилин і продовжуйте промивання. Зверніться до лікаря або в токсикологічний центр для подальшого лікування. Покажіть лікарю упаковку продукту.

Зберігання та утилізація. Діставайте піпетку з упаковки тільки безпосередньо перед застосуванням. Зберігайте в прохолодному (до 25°С) сухому місці, недоступному для дітей. Забороняється заморожувати. Не використовуйте та не зберігайте продукт у безпосередній близькості від опалювальних приладів і відкритого вогню. Не піддавайте впливу прямого сонячного світла.