

14. 02. 2022

Бравекто®
(таблетки жувальні)
листівка-вкладка

Опис

Круглі таблетки від світло- до темно-коричневого кольору з гладкою або шорховатою поверхнею.

Склад

Бравекто® випускають із вмістом відповідної кількості діючої речовини (флураланер) в одній таблетці для собак різної маси тіла.

Одна таблетка містить діючу речовину флураланер:

- 112,5 мг для собак масою тіла 2-4,5 кг (kg);
- 250,0 мг для собак масою тіла 4,5-10 кг;
- 500,0 мг для собак масою тіла 10-20 кг;
- 1000,0 мг для собак масою тіла 20-40 кг;
- 1400,0 мг для собак масою тіла 40-56 кг.

Допоміжні речовини: ароматизатор свинячої печінки, сахароза, крохмаль кукурудзяний, натрію лаурилсульфат, динатрію ембонат моногідрат, магнію стеарат, аспартам, гліцерин, олія соєва, макрогол 3350.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53BX05 - ектопаразитицидні препарати для системного застосування)

Діюча речовина препарату флураланер - сполука з акарицидними та інсектицидними властивостями, активна до кліщів (*Ixodes spp.*, *Dermatocentor spp.*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Demodex spp.*, *Demodex canis*, *Sarcoptes spp.*, *Otodectes spp.*) і бліх (*Ctenocephalides spp.*). Флураланер пригнічує активність нервової системи членистоногих, виступаючи антагоністом у ліганд-залежних хлористих каналцях (рецепторах ГАБА і глутамату).

Флураланер не викликає розвитку у тварин резистентності, що можливе при застосуванні інших інсектоакарицидних сполук. Навіть при досить низьких концентраціях флураланер пригнічує функцію розмноження (яйцекладки) у бліх.

Після перорального введення флураланер швидко всмоктується, досягаючи максимальної концентрації у плазмі крові впродовж однієї доби. Прийом корму пришвидшує всмоктування. Флураланер розподіляється системно і досягає максимальної концентрації у жировій тканині і далі в печінці, нирках і м'язах. Пролонговане утримання, повільне виведення з плазми крові ($t_{1/2}=12$ діб) і відсутність активного метаболізму забезпечує підтримку ефективної концентрації флураланера у проміжку між введенням. Флураланер має кишкову дію на бліх і кліщів, викликаючи загибель бліх через 8 годин після їх прикріплення до організму господаря, кліщів - через 12 годин. Флураланер виводиться переважно у незмінній формі екскрементами (до 90% дози), виведення нирками незначне.

Застосування

Профілактика і лікування собак при ектопаразитарних інвазіях. Препарат забезпечує негайний, стійкий та тривалий (до 12 тижнів) системний інсектицидний і акарицидний захист тварин при імагінальних і ювенальних стадіях розвитку кліщів (*Ixodes ricinus*, *I. hexagonus*, *I. scapularis*, *I. holocyclus*, *Dermacentor reticulatus*, *D. variabilis* та *Rhipicephalus sanguineus*) і бліх (*Ctenocephalides felis* and *canis*.).

Блохи та кліщі повинні попасти на тіло хазяїна та почати годування, щоб діюча речовина потрапила в організм ектопаразита. Препарат Бравекто® викликає загибель бліх через 8 годин після їх прикріплення до тіла хазяїна, кліщів - через 12 годин.

Препарат забезпечує захист від передачі *Babesia canis* кліщами *Dermacentor reticulatus*, вбиваючи кліщів до того, як відбудеться передача збудника babesіозу собаці.

14.02.2022

Бравекто® ефективно контролює популяцію бліх в місцях де утримується та має доступ собака. Препарат можна застосовувати у комплексній терапії блошиних алергічних дерматитів.

Бравекто® застосовують для лікування собак, хворих на демодекоз, спричинений кліщами *Demodex spp.* та *Demodex canis*, а також отодектоз і саркоптоз, спричинених кліщами *Sarcoptes scabiei var. canis* і *Otodectes spp.* під наглядом лікаря ветеринарної медицини. Ефективність Бравекто® при даних інвазіях доведена численними клінічними дослідженнями.

Одноразове застосування Бравекто® запобігає передачі *Dipylidium caninum* від заражених бліх сприйнятливим собакам протягом 12 тижнів.

Дозування

Таблетки задають перорально під час або незадовго до/після годівлі. Доза флуранелера становить 25-56 мг на 1кг маси тіла:

Маса тіла тварини, кг	Доза препарату, кількість таблеток на одну тварину				
	Бравекто® 112,5	Бравекто® 250	Бравекто® 500	Бравекто® 1000	Бравекто® 1400
2-4,5	1				
>4,5-10		1			
> 10-20			1		
> 20-40				1	
> 40-56					1

Перед введенням препарату необхідно точно визначити масу тіла тварини методом зважування. Собакам, масою тіла більше 56 кг, необхідно вводити відповідну комбінацію двох таблеток. Завдяки вмісту в таблетках ароматизаторів таблетки добре поїдаються собаками. За необхідності таблетка може згодовуватися з кормом або її кладуть на корінь язика. Необхідно переконатися у проковтуванні таблетки твариною. Не допускається розламування або ділення таблеток.

Препарат Бравекто® забезпечує захист тварини від бліх і кліщів до 12 тижнів.

Протипоказання

Індивідуальна гіперчутливість тварин до діючої речовини (флуранелера)!

Не застосовувати препарат цуценят до 8-тижневого віку і/або собакам масою тіла до 2 кг маси тіла!

Не застосовувати тваринам з інтервалом меншим, ніж 8 тижнів!

Застереження

Допускається застосування препарату у період вагітності і лактації.

Іноді (до 1,6 % пацієнтів) можливі короточасні симптоми з боку органів травлення (блювота, діарея, зниження апетиту і слинотеча), зумовлені шляхом введення препарату.

Летаргія, м'язовий тремор, атаксія та судороги дуже рідко зустрічаються у спонтанних повідомленнях. Більшість зареєстрованих побічних реакцій мали обмежену та короточасну дію.

Форма випуску

Відповідно для тварин із різною масою тіла випускають таблетки із різним вмістом діючої речовини флуранелера:

- 112,5 мг для собак масою тіла 2-4,5 кг;
- 250,0 мг для собак масою тіла 4,5-10 кг;
- 500,0 мг для собак масою тіла 10-20 кг;
- 1000,0 мг для собак масою тіла 20-40 кг;
- 1400,0 мг для собак масою тіла 40-56 кг.

Препарат випускають у блістерах із алюмінієвої фольги по 1, 2 або 4 таблетки, які пакують у картонні коробки.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей, місце за температури до 30 °С.

14. 0 2. 2022

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Інтервет Інтернешнл Б.В.

Вім де Корверштраат, 35, 5831

АН Боксmeer, НІДЕРЛАНДИ

Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat, 35 5831

AN Boxmeer, The Netherlands

Виробник готового продукту

Інтервет ГесмбХ

Сіменштрассе 107,

1210 Відень, АВСТРІЯ

Intervet GesmbH Siemesstraße 107,

1210 Wien, Austria