

3 0. 0 9. 2020

ПРОФЕНДЕР® для собак
(таблетки)
листівка–вкладка

Опис

Таблетки у формі кісточки.

Склад

1 таблетка містить діючі речовини:
празіквантел - 9,4 %;
емодепсид - 1,9 %.

Допоміжні речовини: кальцію гідрофосфат ангідрид, целюльоза мікрокристалічна, діоксид кремнію, ангідрид кварцу колоїдний, натрію кроскармелоза, стеарат магнію, повідон, ароматизатор яловичини.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51 празіквантел, комбінації)

Властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин - емодепсину та празіквантелу.

Емодепсид – напівсинтетична сполука, яка належить до групи депептидів. Емодепсид ефективний проти *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala* та *Trichuris vulpis*. Стимулює пресинаптичні латрофілінові нервові рецептори паразитів, що призводить до паралічу та їх загибелі.

Празіквантел – є похідним піразинізохінолонів, ефективний проти цестод *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia spp.*

Празіквантел швидко всмоктується зовнішньою оболонкою стъожкових гельмінтів, у результаті чого оболонка руйнується та настає параліч гельмінтів. Така швидка дія зумовлена зміною проникливості клітинної мембрани до іонів кальцію. Подібне порушення метаболізму спричиняє швидку загибель паразиту.

Застосування

Профілактика та лікування собак при змішаних паразитарних інвазіях, спричинюваних гастро-інтестинальними нематодами (круглими гельмінтами) та цестодами (стъожковими гельмінтами):

• нематоди - зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 3 та 4 стадії) *Toxocara canis*; зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 4 стадії) *Toxascaris leonina*; зрілі, незрілі форми *Ancylostoma caninum*; зрілі, незрілі форми *Uncinaria stenocephala*; зрілі, незрілі та личинкові форми (4 стадії) *Trichuris vulpis*;

• цестоди - плоскі гельмінти (цестоди): зрілі форми *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*; зрілі, незрілі форми *Echinococcus multilocularis*; зрілі, незрілі форми *Echinococcus granulosus*.

Дозування

Препарат застосовують перорально одноразово. Мінімальна рекомендована доза емодепсиду - 1 мг/кг маси тіла та празіквантелу - 5 мг/кг маси тіла.

Маса тіла (кг)	Кількість таблеток Профендер® для собак		
	Малі собаки  3 кг	Середні собаки  10 кг	Великі собаки  30 кг
1–1.5	½		

30.09.2020

> 1.5– 3	1		
> 3– 4.5	1 ½		
> 4.5– 6	2		
> 6– 10		1	
> 10– 15		1 ½	
> 15– 20		2	
> 20– 30			1
> 30– 45			1 ½
> 45– 60			2

Препарат (таблетки) мають смак і запах м'яса, тому тварини пойдають його без примусу.

Застосовувати тільки після голодної дієти (якщо застосування препарату планують на ранок, собаку не годувати ввечері)!

Після застосування препарату собаку не годувати 4 години!

Протипоказання

Не застосовувати цуценятам, віком до 12 тижнів або масою тіла меншою 1 кг.

Не застосовувати при відомій гіперчутливості до діючих речовин препарату.

Застереження

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.

При випадковому потраплянні препарату всередину (ШКТ), особливо у дітей, негайно звернутися за медичною допомогою та показати етикетку або листівку-вкладку до препарату.

Форма випуску

Картонні коробки, що містять блістери з алюмінієвої фольги. Таблетки випускають в упакуваннях: для собак середніх розмірів - Профендер® для собак (таблетки 50 мг/10 мг): 24 таблетки (4 блістери по 6 таблеток),

Зберігання

Зберігати в упакуванні виробника.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368 Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen, Germany

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проєнсдорфер Стр. 324,
D-24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma und Veterinar Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
D-24106 Kiel, Germany