

25.04.2018

Стронгхолд 12%
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Розчин для зовнішнього застосування у пластикових тубах.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

селамектин - 120 мг.

Допоміжні речовини: дипропіленгліколь метил-ефір, спирт ізопропіловий, бутилгідрокситолуен.

Фармакологічні властивості

ATCvet класифікаційний код: QP54, ендектоциди (QP54AA05, селамектин)

Діюча речовина препарату селамектин – напівсинтетичний івермектин. Механізм дії пов'язаний зі зміною активності хлорних каналів синаптичних мембран у нервовій та м'язовій системах багатьох ектопаразитів. Зв'язуючись зі специфічними рецепторами, він збільшує проникність синаптичних мембран для іонів хлору, що призводить до блокади активності нервових та м'язових клітин паразитів, та, як наслідок, їх паралічу та загибелі. У ссавців подібні рецептори розміщені лише у центральній нервовій системі. Оскільки селамектин не володіє здатністю проникати крізь гематоенцефалічний бар'єр, він має високий рівень безпечності, і у рекомендованих дозах є безпечним для собак.

Селамектин проявляє широкий спектр системної нематодоцидної, інсектицидної та акарицидної дії, має ларвоцидні та овоцидні властивості.

Діюча речовина із препарату швидко і повністю всмоктується з місця нанесення у кров. Терапевтична концентрація селамектину у крові підтримується тривалий час, забезпечуючи знищенння паразитів та захист від реінвазії впродовж місяця.

Застосування

Профілактика та лікування отодектозу (*Otodectes cynotis*), саркоптозу (*Sarcoptes canis*), токсокарозу (*Toxocara canis*), інвазії волосоїдів (*Trichodectes canis*) та бліх (*Ctenocephalides spp.*), а також для профілактики дірофіляріозу (*Dirofilaria immitis* та *Dirofilaria repens*) у собак.

Дозування:

Препарат наносять на суху шкіру між лопаткам у наступних дозах:

Собаки маса тіла, кг	Колір ковпачка	Доза д.р. на тварину, мг	Концентрація	Номінальний об'єм туби, мл
2,6 – 5,0	Фіолетовий	30	12%	0,25
5,1 – 10,0	Жовто- коричневий	60	12%	0,5
10,1 – 20,0	Червоний	120	12%	1,0
20,1 – 40,0	Зелений	240	12%	2,0
41,0 – 60,0	Сливовий	360	12%	3,0
>60,0	Комбінація туб з розрахунку 6 мг д.р. на кг маси тіла			

Знищенння бліх

Після нанесення препарату дорослі блохи гинуть. Для запобігання інвазії або реінвазії препарат повинен застосовуватись один раз на місяць впродовж сезону активності бліх. Лікування вагітних та лактуючих тварин запобігає блошиній інвазії у цуценят до 7-тижневого віку.

Для використання препарату в якості складової терапії при блошиному алергічному дерматиті препарат застосовують з місячним інтервалом.

25.04.2018

Профілактика дирофіляріозу

Для профілактики дирофіляріозу «Стронхолд 12%» призначають тваринам кожного місяця, починаючи за місяць до початку льоту переносників збудника – москітів/комарів та припиняють не раніше ніж через місяць після завершення льоту комах. У випадку, коли місячний інтервал між двома використаннями «Стронхолду 12%» був порушений, препарат наносять одразу, як тільки з'являється така можливість, що мінімізує можливість розвитку статевозрілих дирофілярій. У випадку використання іншого препаратору для профілактики дирофіляріозу, наступне використання препаратору «Стронхолд 12%» проводять через місяць після останнього використання попереднього препаратору.

Дегельмінтизація при токсокарозі

Тварини віком від 6 тижнів та старіші: препарат застосовують одноразово.

Лікування уражень волосоїдами

Препарат застосовують одноразово.

Лікування отодектозу

Препарат застосовують одноразово. Перед лікуванням рекомендується прочистити слуховий прохід від ексудату та струпів. За необхідності курс лікування повторюють через місяць.

Лікування саркоптозу

Препарат застосовують двічі з інтервалом один місяць.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам віком до 6 тижнів, а також виснаженим і хворим тваринам.

Застереження

Препарат призначений лише для зовнішнього нашкірного застосування.

Не наносити препарат на вологу шкіру.

Не можна купати тварин впродовж 2 годин після нанесення препаратору (до повного висихання).

Не палити, пити або приймати їжу під час роботи з препаратором.

Препарат зберігати подалі від джерел тепла та вогню.

Після обробки тварин ретельно вимити руки з милом. При випадковому попаданні препаратору в очі промити їх протічною водою та звернутися до лікаря.

Після обробки тварини препаратором не контактувати з нею до повного висихання шкіри на місці нанесення (приблизно 30 хвилин).

Препарат токсичний для риб та водних організмів.

Форма випуску

Препарат випускають у однодозованих пластикових тубах в алюмінієвих блістер-пакетах по 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 мл з ковпачками відповідно фіолетового, жовто-коричневого, червоного, зеленого та сливового кольорів:

- туби з фіолетовим ковпачком - 0,25 мл 12% розчину;
- туби з жовто-коричневим ковпачком - 0,5 мл 12% розчину;
- туби з червоним ковпачком - 1 мл 12% розчину;
- туби з зеленим ковпачком - 2 мл 12% розчину;
- туби з сливовим ковпачком – 3 мл 12% розчину.

Вторинне пакування – картонні коробки, що місця три блістер-пакети з тубами.

Зберігання

Сухе темне місце за температури від 10 до 30° С.

Термін придатності – 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення АА-03666-01-13
25.04.2018

Власник реєстраційного посвідчення:

Зоетіс Інк., 10 Сільван Вей,
Парсіппані, Нью Джерсі,
07054, США

Zoetis Inc., 10 Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey,
07054, USA

Виробник готового продукту:

Зоетіс Інк.,
2605 E Кілгор Роуд, Каламазу,
MI 49001, США

Zoetis Inc.,
2605 E Kilgore Road, Kalamazoo,
MI 49001, USA

pethouse