

07.09.2023

PROFILINE нашійник протипаразитарний
(нашийник)
листівка-вкладка

Опис

Нашійник у формі поліхлорвінілової стрічки однорідного (сіро-рожевого, зеленого, коралового, фіолетового) кольору або кольору фуксії, з фіксатором, без тріщин, складок, надривів, збоїв, плям.

Склад

1,0 г нашійника (поліхлорвінілова стрічка) містить діючу речовину:

пропоксур – 85,0 мг.

Допоміжні речовини: поліхлорвінілова стрічка.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53A, ектопаразитарні препарати для місцевого застосування (QP53AE02, пропоксур).

Діюча речовина препарату пропоксур, виявляє активність на ектопаразитів як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого настає загибель ектопаразитів (блохи, кліщі, воші та інші). Для ссавців пропоксур нетоксичний.

Застосування

Профілактика та лікування собак і котів при ураженні ектопаразитами:

- блохами (*Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*),
- іксодовими кліщами (*Ixodes spp.*, *Hyalomma spp.*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Rhipicephalus spp.*) на імагінальній, німфальній та личинковій стадіях розвитку;
- волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*),
- вошами (*Linognathus setosus*).

Дозування

Для великих собак пропонується нашійник довжиною 70±5 см. Для дрібних собак і котів – нашійник довжиною 35±5 см.

Нашійник виймають з упаковки та одягають на шию тварини, фіксуючи таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався невеликий проміжок. Нашійник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Підігнаний належним чином нашійник у закріпленому стані повинен вільно рухатися.

Постійне використання нашійника забезпечує захист тварин від бліх на термін до 5 місяців, від кліщів до 10 тижнів.

Ефективність дії нашійника та тривалість захисту залежить від довжини та стану шерсті, виду збудника та інтенсивності інвазії. Тварин із скуйовдженою та брудною шерстю перед застосуванням нашійника слід вимити шампунем. Рекомендовано періодично обробляти підстилки та засоби догляду за тваринами інсектоакарицидним ветеринарним препаратом ІНСЕКТОСТОП спреї.

Протипоказання

Не застосовують цуценят та кошенят віком до 12 тижнів.

Не застосовують хворим і ослабленим тваринам, а також тваринам, чутливим до складників препарату.

Не застосовувати тваринам із захворюваннями шкіри та ушкодженнями шкірного покриву.

Не застосовують самкам під час вагітності і лактації.

Застереження

Відкривати упаковку з нашійником безпосередньо перед використанням.

07.09.2023

Деякі тварини мають гіперчутливість до пропоксуру і тому на місці нанесення препарату може спостерігатись тимчасове подразнення. При виникненні ознак побічної дії використання нашійника припиняють.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Особи, які працюють з нашійником, повинні дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

При підвищеній індивідуальній чутливості власника тварини до діючої речовини, при наявності на руках подряпин та ушкоджень шкіри слід користуватися гумовими рукавичками.

Після маніпуляцій з нашійником, слід ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Під час одягання нашійника тварині не можна палити, пити, приймати їжу.

Тварин із нашійником не допускати до малих дітей та немовлят.

Форма випуску

Нашійник герметично запакований у фольгований пакет і вкладений у картонну коробку. Для котів та дрібних собак – нашійник 35 ± 5 см; для великих собак – нашійник довжиною 70 ± 5 см.

Зберігання

Зберігати нашійник у закритому упакованні в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 0 до 30°C .

Термін придатності в закритому пакуванні - 5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна