

Додаток 2  
до реєстраційного посвідчення АВ-07426-01-17  
від 18.12.2017 р.

**КРАПЛІ ІНСЕКТО-АКАРИЦИДНІ ДЛЯ СОБАК SEMPERO®**  
(ветеринарні препарати для точкового нанесення (spot-on preparation))  
листівка-вкладка

**Опис**

Масляниста рідина від світло-жовтого до темно-коричневого кольору.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину:

фентіон – 200 мг.

Допоміжні речовини: S-метопрен, 1,2 – пропіленгліколь, гліцерин, спирт ізопропіловий.

**Фармакологічні властивості**

*ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти*

Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючої речовини (фентіону).

Фентіон – інсектицид групи тіофосфорорганічних сполук, механізм дії полягає у блокуванні ферменту ацетилхолінестерази у синапсах НС паразита, що призводить до його загибелі. Фентіон погано проникає через гематоенцефалічний бар'єр теплокровних тварин, але при зовнішньому застосуванні всмоктується через шкіру і проникає у кров. Кровосисні паразити гинуть через попадання в їх організм фентіону з кров'ю тварин.

S-метопрен – аналог ювенільного гормону, регулятора росту комах, порушує синтез хітину, викликає аномалії розвитку комах на стадіях яйця і личинки, запобігає появі статевозрілих комах на тваринах та у місцях перебування тварин.

**Застосування**

Лікування та профілактика собак:

- при ентомозах, спричинюваних блохами (*Ctenocephalides canis*, *Pulex irritans*), волосоїдами (*Trichodectes canis*), вошами (*Linognathus setosus*);

- при акарозах, спричинюваних кліщами (*Demodex canis*, *Otodectes canis*).

Препарат застосовують у комплексній терапії алергічного дерматиту, який спричиняється блохами.

**Дозування**

Препарат застосовують шляхом нанесення на шкіру дорослим собакам та цуценяткам.

**Перед застосуванням зламують або зрізають ножицями піпетку.**

Препарат наносять безпосередньо на шкіру вздовж хребта від шиї до основи хвоста, розгортаючи шерсть і обережно видавлюючи вміст піпетки на шкіру.

Для запобігання злизування препарату твариною можна одягнути "захисний комір" до повного висихання шкіри.

Залежно від маси тіла тварини застосовують препарат відповідного фасування:

| Маса тіла тварини  | Види фасування та доза препарату         |
|--------------------|--|
| від 3 кг до 10 кг  | 1 піпетка – 0,5 мл                       |
| від 10 кг до 25 кг | 2 піпетки по 0,5 мл або 1 піпетка – 1 мл |
| від 25 кг до 50 кг | 2 піпетки по 1 мл                        |
| більше 50 кг       | 3 піпетки по 1 мл                        |

Термін дії інсекто-акарицидного препарату після одноразової обробки тварини становить не менше 30 діб. При необхідності проводять повторну обробку тварин, але не частіше, ніж 1 раз на місяць.

**Протипоказання**

Підвищена чутливість до фентіону!

Не застосовувати цуценят до 4-місячного віку та масою тіла до 3 кг!

Не застосовувати ослабленим, хворим та виснаженим тваринам!

Не застосовувати препарат вагітним тваринам за тиждень до родів!

**Застереження**

При підвищеній індивідуальній чутливості тварин до діючої речовини (фентіон) крапель у тварин можуть виникнути ознаки подразнення шкіри, слюзотеча, посилена саливація, тремор м'язів, блювота. У таких випадках рекомендується змити препарат водою з милом.

При роботі з препаратом дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Обробку тварин необхідно проводити у гумових рукавицях, на відкритому повітрі або у добре вентиляваному приміщенні, після обробки ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Не рекомендується мити, гладити тварин руками протягом 24 годин після обробки препаратом. Уникати контакту маленьких дітей з обробленими препаратом тваринами.

При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки, в очі, необхідно його змити проточною водою.

**Форма випуску**

Полімерні ампули-крапельниці або флакони-піпетки по 0,5 та 1 мл. Вторинна упаковка – картонна коробка.

**Зберігання**

Зберігають препарат у закритому упакованні виробника, у сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 5 до 25°C.

Термін придатності – 18 місяців.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Виробник готового продукту:** ТОВ "Ветсинтез" (Україна) 61001, м. Харків, вул. Смольна, 30. Тел./факс: (057) 714-37-51; 714-37-52

**Власник реєстраційного посвідчення:**

ТОВ "ТБК "Лайф-Груп" (Україна) 61027, м. Харків, пр-т Гагаріна, 201.

Тел.: (057) 341-73-77, e-mail: office@vitomax.ua