

**ПЛАТІНУМ для собак та котів краплі протипаразитарні  
(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)  
листівка–вкладка**

**Опис**

Масляниста рідина зі специфічним запахом складових компонентів.

**Склад**

1 мл препарату містить діючі речовини:

фіпроніл - 100 мг;

івермектин - 15 мг.

Допоміжна речовина: пропіленгліколь.

**Фармакологічні властивості**

**АТСvet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди і репеленти (QP53AX15, фіпроніл, комбінації).**

Препарат ПЛАТІНУМ для собак та котів краплі протипаразитарні – екто- та ендopаразитоцид, фармакологічні властивості якого зумовлені властивостями діючих речовин фіпронілу та івермектину.

**Фіпроніл** уражає центральну нервову систему ектопаразитів, не впливаючи на центральну нервову систему ссавців. Механізм дії фіпронілу у безхребетних полягає в тому, що препарат гальмує проходження іонів хлору у ГАМК-залежних хлоридних каналах, порушуючи роботу нервової системи. Через системне блокування фіпронілом нервової системи настає нервове перезбудження і загибель ектопаразита.

Фіпроніл має контактну дію і практично не всмоктується через шкіру. Він накопичується в епідермісі, жирових залозах волосяних фолікул і поступово вивільняється забезпечуючи тривалу контактну інсектоакарицидну дію. Створюється ефект "резервуару", що забезпечує тривалу залишкову активність фіпронілу.

**Івермектин** належить до сполук, що продукуються мікроорганізмами групи *Streptomyces avermitilis*. Івермектин має виражену протипаразитарну дію на личинкові і статевозрілі форми нематод. Механізм дії івермектину на організм паразита полягає у тому, що він стимулює виділення нейромедіатора гальмування, гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), у пресинаптичних нейронах, який зв'язується зі спеціальними рецепторами нервових закінчень, збільшуючи проникність мембран для іонів хлору, це викликає параліч і загибель паразита.

**Застосування**

Профілактика та лікування тварин при ураженні: блохами (*Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), вошами (*Linognathus setosus*) та паразитиформними кліщами (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor pictus*, *Dermacentor marginatus*, *Rhipicephalus bursa*), саркоптоїдозними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*, *Sarcoptes canis*), кліщами роду *Demodex*; попередження дирофіляріозу (ефективний проти личинок L3 і L4 стадії *Dirofilaria immitis*).

**Дозування**

Препарат наносять на суху, неушкоджену шкіру відповідно до маси тіла тварини.

Для собак і котів різної маси тіла використовують піпетки відповідного об'єму:

| <b>Вид тварин та маса тіла</b>    | <b>Об'єм піпетки, мл</b> | <b>Вміст фіпронілу, мг/1 піпетку</b> | <b>Вміст івермектину, мг/1 піпетку</b> |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| собаки масою тіла до 4 кг         | 0,5                      | 50                                   | 7,5                                    |
| собаки масою тіла від 4 до 10 кг  | 1,0                      | 100                                  | 15                                     |
| собаки масою тіла від 10 до 30 кг | 2,0                      | 200                                  | 30                                     |
| коти масою тіла до 4 кг           | 0,5                      | 50                                   | 7,5                                    |
| коти масою тіла від 4 до 8 кг     | 1,0                      | 100                                  | 15                                     |

Препарат застосовують лише зовнішньо, наносять безпосередньо на шкіру за допомогою піпетки, у місця недоступні для злизування (ділянка холки та вздовж хребта). У ділянці шиї біля основи черепа розгортають шерсть тварини, щоб видно було шкіру, відламують верхню частину піпетки і, розміщуючи кінець піпетки на шкірі, витискають вміст піпетки. При обробці тварин великих розмірів вміст піпетки наносять на шкіру у 3-4 точки вздовж хребта, від холки до хвоста.

Одноразова обробка захищає тварин від ектопаразитів протягом 4-х тижнів.

З профілактичною метою тварин обробляють кожні 1-1,5 місяці.

При саркоптоїдозах та демодекозі обробку проводять 2-3 рази з інтервалом у 8-10 діб.

#### **Протипоказання**

Не застосовують хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовують тваринам віком до 12 тижнів.

Не застосовують собакам та котам чутливим до фіпронілу та івермектину або до інших складників препарату!

Не призначати собакам чутливих порід (коллі, шелті, бобтейл) їх метисам і породам близьким до них.

Не застосовують самкам під час лактації і вагітності!

#### **Застереження**

Після обробки тварин препаратом не допускати злизування препарату (одягають захисний комірець, намордник, фіксують щелепи допоміжними засобами).

Не слід купати тварин та не дозволяти їм плавати у відкритих водоймах протягом 48 годин після обробки препаратом, а також наносити препарат на вологу або пошкоджену шкіру.

Після обробки тварин не гладити їх та не допускати контакту маленьких дітей з обробленими тваринами впродовж 24 годин.

#### **Спеціальні застереження при роботі з препаратом**

Власникам тварин при роботі з препаратом дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

При випадковому потраплянні препарату на шкіру, слизові оболонки або очі необхідно ретельно промити їх проточною водою.

Власники тварин із гіперчутливістю до складників препарату обробку тварин повинні проводити у гумових рукавицях.

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.

Тварин за три доби до та за три доби після обробки не купають. Після закінчення цього терміну купання без зоошампуню не знижує захисного ефекту препарату.

#### **Форма випуску**

Полімерні піпетки по 0,5; 1,0; 2,0 мл.

#### **Зберігання**

Зберігати препарат у закритому пакуванні виробника у сухому, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 5 до 25 °С.

#### **Термін придатності**

3 роки.

***Для застосування у ветеринарній медицині!***

#### **Вироблено на замовлення**

ТОВ «ТБК» Лайф-Груп», пр. Героїв Харкова, 247 Б, м. Харків, 61200, Україна, тел.: (057) 341-73-77.

#### **Виробник готового продукту**

ТОВ «УКРБІОНІТ», 61109, м. Харків, вул. Тернопільська, буд. 6, Україна.