

24.12.2020

**Енроксил® 150 мг таблетки зі смаком м'яса  
(таблетки)  
листівка-вкладка**

**Опис**

Круглі, злегка двоопуклі таблетки зі скошеними краями та рискою на одному боці, від кремового до блідо-коричнюватого кольору з можливими білими та темними плямами.

**Склад**

1 таблетка (550 мг) препарату містить діючу речовину:  
енрофлоксацин – 150 мг.

Допоміжні речовини: маніт, крохмаль кукурудзяний, натрію крохмальгліколят, ароматизатор м'ясний 10022, акрилатний сополімер, натрію лаурилсульфат, дигутилсебацінат, натрію кроскармелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, магнію стеарат.

**Фармакологічні властивості**

ATC vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01MA90 - Енрофлоксацин.

Енрофлоксацин належить до антибіотиків групи фторхінолонів. Він ефективно діє проти більшості патогенних мікроорганізмів: *Mycoplasma spp.*, *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium perfringens*, *Actinobacillus spp.* і *Enterococcus spp.* Енрофлоксацин проявляє протимікробну дію шляхом гальмування активності ферменту ДНК-гірази, який є каталізатором реплікації ДНК у бактеріальній клітині. Гальмування активності ДНК-гірази призводить до функціональних розладів, блокування біосинтезу у клітині та загибелі патогенного мікроорганізму. Чинить бактерицидну дію, особливо по відношенню до мікроорганізмів, резистентних до бета-лактамних антибіотиків, тетрациклінів, аміноглікозидів і макролідів.

У дослідженнях на собаках при застосуванні енрофлоксацину в дозі 4,91 мг/кг маси тіла максимальна його концентрація в плазмі  $1179,94 \pm 260,83$  нг/мл досягалася через  $1,57 \pm 0,62$  год. Період напіввиведення становить 3,78 год.

Майже 40% енрофлоксацину, введеного собакам перорально, перетворюється в ципрофлоксацин. Максимальна концентрація ципрофлоксацину у плазмі сягає  $491,99 \pm 57,95$  нг/мг.  $T_{max}$  становить  $1,79 \pm 2,6$  год. Період напіввиведення становить 5,10 год.

Енрофлоксацин швидко надходить у тканини. Концентрація у тканинах і рідинах тканин у 2-3 рази перевищує концентрацію у сироватці крові. Високі рівні енрофлоксацину відмічаються в легенях, печінці, нирках, шкірі, кістках та лімфатичній системі. Енрофлоксацин також надходить у цереброспінальну рідину, внутрішньоочну рідину та у плід вагітних тварин.

Енрофлоксацин виводиться з організму, головним чином, разом із сечею.

**Застосування**

Лікування собак при захворюваннях травного каналу, органів дихання і сечостатової системи, шкіри та вух (зовнішній отит), вторинних інфекціях ран, що спричинені чутливими до енрофлоксацину мікроорганізмами.

**Дозування**

Перорально у дозі 5 мг енрофлоксацину на 1 кг маси тіла (1 таблетка на 30 кг маси тіла) на добу одноразово або по 2,5 мг (1/2 таблетки на 30 кг маси тіла) двічі на добу, незалежно від годівлі.

Тривалість лікування становить 5 – 10 діб.

**Протипоказання**

Підвищена чутливість до енрофлоксацину.

Не застосовувати при виявленні стійких штамів патогенних бактерій, резистентних до хінолонів.

Не застосовувати собакам малих порід у перші 12 місяців життя і собакам великих порід - у перші 18 місяців життя.

Не застосовувати тваринам з ознаками захворювань центральної нервової системи.

Не застосовувати одночасно з препаратами тетрациклінового ряду, макролідами, хлорамfenіколом, теофіліном.

Енрофлоксацин не застосовувати з профілактичною метою.

#### **Застереження**

##### **Побічна дія**

Побічні ефекти при застосуванні енрофлоксацину спостерігаються дуже рідко і в основному пов'язані з порушеннями з боку травного каналу: блювота, анорексія. При появі побічних ефектів немає необхідності припиняти лікування, оскільки побічні ефекти незначні і короткотривали.

##### **Особливі застереження при використанні**

Препарати з групи хінолонів провокують ушкодження хрящів суглобі та інші форми артропатії у молодих тварин, які швидко ростуть. З обережністю застосовувати собакам з тяжкими порушеннями функції нирок та печінки.

##### **Застосування під час вагітності, лактації, несучості**

Енрофлоксацин призначають вагітним та лактуючим самкам лише у випадках, коли очікувана користь переважає можливий ризик для плода/цуценят/котенят.

##### **Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії**

Не застосовувати одночасно з препаратами тетрациклінового ряду, макролідами, хлорамfenіколом, теофіліном.

При одночасному застосуванні з препаратами, що містять у своєму складі катіони Mg<sup>2+</sup> та Al<sup>3+</sup> порушується абсорбція енрофлоксацину.

#### **Форма випуску**

10 таблеток в блістері, 1 або 10 блістерів у картонній упаковці.

#### **Зберігання**

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °C до 25°C.

Термін придатності – 3 роки. Половину таблетки можна повернути до блістера та використати протягом 24 годин

#### **Для застосування у ветеринарній медицині!**

##### **Власник реєстраційного посвідчення:**

CRKA, d.d., Ново місто  
Шмар'єшка цеста 6,  
8501 Ново місто,  
Республіка Словенія.

**Виробників готового продукту**  
CRKA, d.d., Ново місто  
Шмар'єшка цеста 6,  
8501 Ново місто,  
Словенія

CRKA-FARMA d.o.o.,  
В. Холевца 20/Е,  
10450 Яструбарсько,  
Хорватія

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia  
Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto,  
Slovenia

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia  
Šmarješka cesta 6,  
8501 Novo mesto,  
Slovenia

KRKA-FARMA d.o.o.,  
V. Holjevca 20/E,  
10450 Jastrebarsko,  
Croatia