

Суrolан
(суспензія для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Суспензія білого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):

міконазолу нітрат	23,
поліміксину В сульфат	0,53,
преднізолону ацетат	5.

Допоміжні речовини: колоїдний безводний кварц, рідкий парафін.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QD01 Протигрибкові препарати для дерматології.

Суrolан — комбінований протизапальний, протигрибковий препарат, що згубно діє на дерматоміцети та патогенні грибки, має протибактерійну дію.

Міконазолу нітрат діє на грибки шляхом блокування синтезу ергостерину, що є складовим компонентом дріжджів та грибкових мембран.

Поліміксину сульфат — поліпептидний антибіотик з групи поліміксинів. Діє бактерицидно, зв'язуючись з фосфоліпідами в цитоплазмі мембран. Це призводить до порушення мембранної прохідності, яка і спричинює бактеріальний автоліз.

Преднізолону ацетат — кортикостероїд із протизапальними властивостями, що блокує формування запальних медіаторів, а саме простагландинів, упродовж запального процесу та зменшує область ураження.

Суrolан є також ефективним препаратом у боротьбі проти кліщів (*Otodectes cynotis*) у вухах собак та котів.

Застосування

Застосовують препарат для лікування собак та котів при зовнішньому отиті, дерматиті шкіри, що спричинені патогенними грибами (*Microsporium spp.*, *Trichophyton spp.*, *Candida spp.*, *Malassezia pachydermatis*), грампозитивними та грамнегативними бактеріями (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Escherichia coli*), кліщами (*Otodectes cynotis*).

Дозування

При роботі з вушним каналом тварини проводять його очищення; застосовують по 3-5 крапель Суrolану в кожне вухо двічі на добу. Для оптимального розподілу препарату необхідно промасажувати ділянку біля вуха.

При нанесенні препарату на шкіру необхідно одягнути гумові рукавички. Декілька крапель Суrolану нанести на уражену ділянку шкіри та добре розтерти. Застосовувати двічі на добу.

При грибковому отиті та бактеріальному отиті препарат застосовують упродовж 3-5 діб до зникнення клінічних ознак захворювання. Інколи обробку уражених місць необхідно продовжувати протягом 2-3 тижнів.

У разі виникнення клінічних ознак, спричинених кліщем *Otodectes cynotis*, необхідно закріпувати по 5 крапель Суrolану у вушний канал двічі на добу впродовж 14 діб.

Навіть, якщо уражене лише одне вухо тварини, обробку необхідно проводити одночасно двох вушних каналів.

Противпоказання

Не застосовувати при підвищеній чутливості до компонентів препарату.

Не застосовувати при перфорації барабанної перетинки.

Застереження

Не рекомендовано застосовувати вагітним та лактуючим тваринам.

Перед застосуванням необхідно струсити флакон.

За необхідності, перед початком або під час лікування, довкола ураженої ділянки шкіри шерсть підстригають.

12.03.2022

Зміна дозування може призвести до зниження ефективності дії суспензії.

При контакті з препаратом необхідно користуватися гумовими рукавичками.

Надмірне застосування кортикостероїдів може спричинити низку незворотних процесів шкіри.

Форма випуску

Поліетиленові флакони у вигляді піпеток об'ємом 15 і 30 мл.

Зберігання

Сухе темне місце при температурі від 0 до 25 °С.

Термін придатності.

2 роки за умови зберігання в упаковці;

3 місяці після першого відкривання флакону.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Еланко ГмбХ

Хайнц-Ломан-Штр. 4, 27472 Куксхафен

Німеччина

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven

Germany

Виробник готового продукту

Лузомедікамента, Сосіедаде Текніка

Фармацевтіка, С. А.

Естрада Консіглієрі Педрозо, № 66, 69-Б

Куелуз де Байксо

2730-055 Баркарена, Португалія

Lusomedicamenta, Sociedade Tecnica

Farmaceutica, S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, n. 66, 69-B

Queluz de Baixo

2730-055 Barcarena, Portugal