

24.11.2020

## Коротка характеристика препарату

### 1. Назва

УНІСАН®

### 2. Склад

1 г препарату містить діючі речовини (мг):

хлоргексидину біглюконат 10,0;

цинку оксид 50,0.

Допоміжні речовини: диметилсульфоксид, ПЕГ-1500, вода очищена.

### 3. Фармацевтична (лікарська) форма

Мазь.

### 4. Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QD08AC52 Хлоргексидин, у комбінаціях.

Препарат має виражену антисептичну дію. Компоненти мазі ефективні по відношенню до вегетативних форм грампозитивних (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Mycobacterium spp.*, *Corynebacterium xerosis*, *Micrococcus spp.*, *Sarcina lutea*, *Clostridium spp.*, *Bacillus subtilis*) і грамнегативних бактерій (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Serratia marcescens*, *Providencia spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Neisseria spp.*), а також дріжджів (*Candida spp.*), дерматофітів (*Dermatophytes*, *Microsporum*, *Trichophyton*, *Trichoderma*), ліпофільних вірусів, хламідій. Крім того, препарат має протизапальну, в'яжучу, місцево-аналгетичну дії.

### 5. Клінічні особливості

#### 5.1 Вид тварин

Велика рогата худоба, вівці, кози свині, коні, птиця, собаки, коти, кролі.

#### 5.2 Покази до застосування

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз свиней, коней, птиці, собак, котів за захворювань шкіри, які викликані бактеріальною та грибковою мікрофлорою, а саме: стафілококоз шкіри, всі види піодермії, імпетигіозна екзема, кандидоз шкіри, дерматомікози (трихофітія, мікроспорія), себорея, зовнішній отит, гнійні рані, поверхневі абсцеси, опіки.

#### 5.3 Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до хлоргексидину біглюконату.

Не застосовувати одночасно з препаратами йоду.

#### 5.4 Побічна дія

Даних немає.

#### 5.5 Особливі застереження при використанні

Уникати потрапляння мазі на слизові оболонки очей.

#### 5.6 Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Без обмежень.

#### 5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з препаратами йоду, щоб уникнути розвитку дерматитів.

#### 5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Мазь наносять тонким шаром на уражену ділянку шкіри 1-2 рази на добу до повного одужання. Тривалість застосування визначається видом патологічного процесу, але не менше 2-3 діб після зникнення клінічних ознак захворювання. При грибкових захворюваннях тривалість лікування становить 7-10 діб після зникнення клінічних ознак захворювання. При гнійних ранах і абсцесах просочують маззю марлеві серветки, якими заповнюють рану чи порожнину абсцесу. Перев'язки проводять щодня до повного очищення від гнійно-некротичних мас.

#### 5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не спостерігались.

#### 5.10 Спеціальні застереження

Немає.

#### 5.11 Період виведення (каренції)

Відсутній.

24.11.2020

**5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу  
Відсутні.**

**6. Фармацевтичні особливості**

**6.1 Форми несумісності (основні)**

Не застосовувати одночасно з препаратами йоду!

**6.2 Термін придатності**

2 роки.

**6.3 Особливі заходи зберігання**

Сухе темне місце при температурі від 0 до 25 °C.

**6.4 Природа і склад контейнера первинного упакування**

Скляні банки або контейнери полімерні по 200 г, туби алюмінієві або полімерні по 15 г.

**6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками**

Невикористаний препарат або його залишки утилізують згідно із чинними вимогами.

**7. Назва і місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

ТОВ «АТ Біофарм»

пров. Театральний, 5-1а, м. Харків, 61057, УКРАЇНА

**8. Назва і місцезнаходження виробників**

ТОВ «АТ Біофарм»

prov. Театральний, 5-1а, m. Харків, 61057, УКРАЇНА

ТОВ «НВП Біофарм»

вул. Залізнична, 31-Н, м. Дергачі, Харківська обл., 62300, УКРАЇНА

**9. Додаткова інформація**

Відсутня.