

Екодезмаст PETS

Гель протизапальний, антисептичний, зволожуючий



Об'єм 100г, 320г

Гель протизапальний, антисептичний, зволожуючий "Екодезмаст"

Протизапальний, антисептичний та зволожуючий гель, який вкриває шкіру тонким жирним шаром і таким чином оберігає її від висихання. Захищає шкіру від шкідливих впливів навколошнього середовища. Після застосування гелю шкіра стає пружною, м'якою, не тріскається. Екодезмаст має антисептичну дію, діє протизапально і протизастійно, швидко всмоктується в уражену шкіру.

ХАРАКТЕРИСТИКА

"Екодезмаст" – Гель протизапальний, антисептичний, зволожуючий, вкриває шкіру тонким жирним шаром і таким чином оберігає її від висихання. Також захищає шкіру молочної залози від шкідливих впливів навколошнього середовища, що є осо бливо важливим для кішок та сук у період лактації та в зимовий період. Саме тогі шкіра молочної залози піддається подразникам.

Після застосування гелю шкіра стає пружною, м'якою, не тріскається. Екодезмаст має антисептичну дію, оскільки зменшує кількість мікроорганізмів на шкірі. Окрім цього, Екодезмаст діє протизапально і протизастійно, швидко всмоктується в уражену шкіру.

ПОКАЗАННЯ:

Первинні шкірні ураження, інфекційно-алергічна форма дерматозу, мастит (в комплексній терапії), субклінічний мастит, захист шкіри молочної залози від висихання, набряк молочної залози; тріщини шкіри, бородавки, укуси комах та інші свер блячі місця на шкірі; забиті місця, запальний процес, кругові мозолі в області верхівки соска; інфекційні та септичні захворювання, котрі викликаються мікробними асоціаціями вірусів, бактерій і грибків; абсцеси, мікробна екзема, гематоми; флебіт, перифлебіт, лімфангіт, менінгіт. Для нейтралізації негативної дії різних хімікатів (пестициди, інсектициди, фунгіциди, важкі метали), реакції гіперчутливості.

Під час профілактики, а також лікування маститу молоко використовується без обмежень

ФОРМА ВИПУСКУ:

Полімерна тара 320г, 100 г

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Сухе темне вентильоване приміщення при температурі від 0°C до +25°C.

СКЛАД

Гель не токсичний, не містить барвників і віддушок.

Гідроксиг 1,8,3,6-діендометилен-1,3,6,8-тетраазациклодекан, настойка ехінацеї пурпурної трави, ментол, екстракт календули, екстракт ромашки, екстракт солодки, карбомер.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Молочні залози: після годування змащують гелем.

Мастит: при появі перших ознак захворювання молочні залози інтенсивно змащують і масажують. Процедуру слід повт орювати кожні 4 години аж до зникнення клінічних ознак захворювання. Таке лікування є догатковим і застосовується лише в комбінації з лікуванням.

- в усіх наступних прикладах гель застосовують 2-3 рази на добу і процедуру повторюють до покращення загального стану тварини. Набряк молочної залози: молочну залозу інтенсивно змащують і масажують. Опіки, укуси комах та інші свер блячі місця на шкірі: уражені місця змащують товстим шаром. Збиті місця, гематоми, флебіт, перифлебіт, лімфангіт, менінгіт: уражені місця змащують товстим шаром і деякий час масажують.

Рекомендується захищати уражені місця бинтовою пов'язкою, щоб тварини не могли злизувати гель з хворих місць, дода тково їх травмуючи, оскільки це гальмуватиме загоєння

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Відкриті рані

Інгібіторна чутливість до окремих компонентів гелю

Виготовлено на замовлення ТОВ УНСП «Санлайф ЛТД» 79005 вул. Скельна, 1

Адреса виробничих потужностей: ТзОВ «Українсько-польське спільне підприємство «ЗВК»

79024 вул. Промислова, 50/52

westvet.com.ua

office@westvet.com.ua