

26.11.2019

Коротка характеристика продукту

1. Назва

ВЕСЕЛИЙ КІТ фітокомплекс для покращення функції сечовивідної системи

2. Склад

Фітокомплекс рідких екстрактів рослин: трави хвоща польового (*Herba Equiseti arvensis*), трави спориш пташиного (*Herba Polygoni avicularis*), трави спориш почечуйного (*Herba Polygoni persicariae*), листя кропиви (*Folia Urticae*); льняна олія, натрій лимоннокислий, твін 80 (полісорбат), вода очищена.

1,0 мл кормової добавки містить:

| Компоненти | Одиниці виміру | Кількість |
|---|----------------|-----------|
| Сирий протеїн, не більше | % | 4,0 |
| Жир, не більше | % | 0,5 |
| Волога, не більше | % | 53,0 |
| Сума флавоноїдів у перерахунку на рутин, не менше | % | 0,004 |

3. Форма випуску

Емульсія.

4. Фармакологічні властивості

Фітокомплекс рідких екстрактів рослин, який входить до складу кормової добавки, має салоретичні (солевивідні), діуретичні (сечогінні), протизапальні властивості, позитивно впливає на стан стінок капілярів.

Олія льняна містить в своєму складі поліненасичені жирні кислоти Омега-3, Омега-6, вітаміни А, Е, К, F, вітаміни групи В, калій, фосфор, магній, залізо, цинк, лецитин, бета-каротин, які сприяють покращенню фізіологічного стану тварини.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коти.

5.2 Показання до застосування

Застосовують для поліпшення роботи сечовивідних шляхів при лікуванні тварини за сечокам'яної хвороби та урологічного синдрому, покращення обміну речовин, загального фізіологічного стану шкіри та шерсті.

Рекомендовано кошенятам з 12-тижневого віку.

5.3 Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів.

5.4 Особливі застереження при використанні

Не перевищувати рекомендованого дозування!

5.5 Застосування під час вагітності, лактації

Рекомендовано застосування згідно з дозуванням.

Перед застосуванням слід проконсультуватись з лікарем ветеринарної медицини.

5.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Немає.

5.7 Дози і способи введення тваринам різного віку

Кормову добавку застосовують перорально у дозі (на 1 тварину):

2-4 мл два рази на добу впродовж 5-7 діб.

Курс повторюють кожні 3-4 місяці.

5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Слід дотримуватись рекомендованого дозування.

5.9 Спеціальні застереження для осіб та обслуговуючого персоналу

Немає.

26.11.2019

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Термін придатності

18 місяців.

6.2. Особливі заходи безпеки при зберіганні

Сухе місце за температури від 0 до 25°C.

6.3 Природа і склад контейнера первинного пакування

Полімерні флакони, шприци-туби, туби, об'ємом 5; 10; 12; 20; 30; 40; 60 мл вкладені у картонні коробки по 1; 2; 3 штуки.

6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний продукт або його залишки утилізують згідно з чинними вимогами.

7. Назва та місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна

8. Назва та місце знаходження виробника

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна

9. Додаткова інформація