

МІКОСТОП
(розчин для зовнішнього застосування)
лістівка-вкладка

Опис

Прозора рідина рожевого кольору зі специфічним запахом.

Склад

1,0 ml (мл) препарату містить діючі речовини:

клотримазол - 10 mg (мг);

саліцилову кислоту - 70 mg (мг).

Допоміжні речовини: спирт ізопропіловий, вода очищена, фукорцин, натрію гідроксид.

Фармакологічні властивості

ATC vet QD01, протигрибкові ветеринарні препарати для застосування у дерматології (QD01AC01, клотримазол)

Діюча речовина препарату клотримазол належить до групи імідазольних протигрибкових речовин широкого спектру дії. Активний до патогенних дерматофітів (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporium canis*, *Aspergillus* spp), дріжджових грибів (*Candida* spp, *Rhodotorula* spp, *Malassezia furfur*), грампозитивних (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp) та грамнегативних бактерій (*Bacteroides* spp, *Corynebacterium minutissimum*), а також до одноклітинних найпростіших.

Протигрибковий ефект зумовлений порушенням синтезу ергостерину, який входить до складу клітинної мембрани фунгіцидних і дріжджових грибів.

Клотримазол погано всмоктується через шкіру та слизові оболонки, його концентрація у глибоких шарах епідермісу вища від мінімальної концентрації, яка необхідна для пригнічення дерматофітів. При зовнішньому застосуванні концентрація клотримазолу вища в епідермісі, ніж у дермі і підшкірній клітковині.

Саліцилова кислота посилює дію клотримазолу, діє протизапально та протиалергічно, запобігає утворенню набряків.

Застосування

Лікування котів та собак при дерматомікозах, спричинюваних патогенними дерматофітами (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporium canis*, *Aspergillus* spp), дріжджовими грибами (*Candida* spp, *Rhodotorula* spp), грампозитивними (*Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp) та грамнегативними бактеріями (*Bacteroides* spp, *Malassezia furfur*, *Corynebacterium minutissimum*), чутливими до клотримазолу.

Дозування

Препарат МІКОСТОП застосовувати зовнішньо. Уражену ділянку шкіри змочувати препаратом за допомогою тампону 1-2 рази на добу впродовж 7-14 днів до клінічного видужання тварин, яке підтверджується негативним результатом мікологічного та/або бактеріального дослідження.

Протипоказання

Немає

Застереження

Не допускати злизування препарату тваринами після обробки та уникати попадання препарату в очі.

При роботі з препаратом дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Забороняється палити, пити та приймати їжу під час роботи з препаратом. Після

роботи препаратом ретельно вимити руки з милом.

Форма випуску

Полімерні флакони по 10 ml (мл), полімерні флакони з механічними розпилювальними головками по 30 ml (мл), упаковані в картонні коробки.

Зберігання

У сухому, темному місці окремо від продуктів харчування та кормів у недоступному для дітей і тварин місці, за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності

2 роки. Після першого відкриття первинного упакування - 14 дб.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.

+38(057) 766-36-36

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.

info@provet.ua

provet.ua