

Додаток 2
до реєстраційного посвідчення АА-01315-01-10

24.12.2020

ЧЕМІ СПРЕЙ
(спрей для зовнішнього застосування, суспензія)
листівка-вкладка

Опис

Суспензія синього кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

хлортетрациклін (гідрохлорид) - 20 мг.

Допоміжні речовини: патентований синій V (E 131), спирт ізопропіловий, етанол, газ-витискувач пропел-45.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QD06 – антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для місцевого застосування. QD06AA02- Хлортетрациклін.

Хлортетрациклін належить до групи тетрациклінів. Він інгібує синтез протеїну в бактеріях шляхом зв'язування з 30S субодиницею рибосоми бактерії, блокуючи частину РНК, що відповідає за перенесення амінокислоти. Хлортетрациклін активний проти грампозитивних (*Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*) та грамнегативних (*Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Fusobacterium spp.*) мікроорганізмів, а також проти найпростіших (*Protozoa spp.*), мікоплазм (*Mycoplasma spp.*), рикетсії (*Rickettsia spp.*) та хламідій (*Chlamydia spp.*).

Хлортетрациклін не проникає скрізь шкіру, а тому діє місцево.

Застосування

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, свійської птиці (курей, індиків, гусей, качок), котів та собак, при хірургічних та травматичних ранах, інфекційно-запальних ураженнях копит, міжпальцевому дерматиті у парнокопитних, виразках, абсцесах (на ранніх стадіях), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до хлортетрацикліну.

Дозування

Зовнішньо. Перед застосування пошкоджену ділянку ретельно очищають від сторонніх тіл, ексудату, некротичного матеріалу. Флакон із препаратом ретельно струшують. Пошкоджену ділянку обробляють препаратом протягом 2-3 секунд із відстані 15-20 см. Обробляти необхідно до повного одужання.

Протипоказання

Підвищена чутливість до хлортетрацикліну. Не застосовувати препарат для лікування ран на вимені корів, молоко яких застосовують для споживання людям.

Застереження

Побічна дія

Місцеві реакції на шкірі, а саме поодинокі випадки алергічного дерматиту.

Особливі застереження при використанні

Не допускати попадання препарату в очі тварин. Не дозволяти тварині протягом 5 хвилин злизувати препарат. Перед застосуванням флакон з препаратом необхідно ретельно струсити.

За можливості необхідно зробити тест на чутливість мікроорганізмів-збудників до препарату.

Період виведення (каренції)

У разі вимушеного забою тварини, оброблені місця необхідно видалити.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При застосуванні препарату тваринам обслуговуючому персоналу необхідно дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами, а саме: не допускати попадання в очі, уникати попадання на шкіру, уникати вдихання парів, мити руки після використання, не використовувати аерозоль біля відкритих вогнищ чи нагрівальних приладів. Вогнєнебезпечний. Уникати прямих сонячних променів та температури, вищої за 45°C. Не палити під час використання препарату.

Форма випуску

Флакон з алюмінію по 250 мл.

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення АА-01315-01-10

24.12.2020

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності – 2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Індустріал Ветерінарія, С.А.	Industrial Veterinaria, S. A.
Есмеральда, 19	Esmeralda, 19
08950 Есплугес де Льобрегат	08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
(Барселона) Іспанія	Spain

Виробники готового продукту:

Індустріал Ветерінарія, С.А.	Industrial Veterinaria, S. A.
Есмеральда, 19	Esmeralda, 19
08950 Есплугес де Льобрегат	08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
(Барселона) Іспанія	Spain

ДІВАСА-ФАРМАВІК, С.А.
Ктра. Сант Іполіт, Км 71,
Гурб-вік, 08503
Барселона, Іспанія

DIVASA-FARMAVIC, S.A.
Ctra. Sant Hipolit, Km. 71,
Gurb-Vic, 08503
Barcelona, Spain