

Фунгіцидно-акарицидна мазь «Ям»

(мазь)

листівка-вкладка

Опис

Густа мазеподібна маса від світло-сірого до темно-сірого з коричневим відтінком кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 г препарату містять діючі речовини:

дьоготь березовий – 10 г;

скипидар живичний – 7 г;

сірку – 10 г;

кислоту саліцилову – 2 г;

цинку оксид – 10 г;

лізол – 6 г.

Допоміжні речовини: ланолін, вазелін.

Фармакологічні властивості

АТСvet QD - дерматологічні ветеринарні препарати (QD10AX30, різні комбінації препаратів).

Препарат має виражені фунгіцидні, бактерицидні та протипаразитарні властивості, зумовлені синергічною дією речовин, що входять до складу препарату.

Дьоготь березовий діє антисептично та протипаразитарно, проявляє місцеву подразнюючу, в'яжучу та підсушуючу дії.

Протипаразитарна та протимікробна дія сірки зумовлена здатністю за наявності вологи, лугів і органічних речовин утворювати сірчистий ангідрид, сірководень, кисень і сірчисті луги, які діють кератопластично та кератолітично.

Саліцилова кислота при місцевому застосуванні подразнює шкіру та сприяє відторгненню ороговілих клітин епітелію. На поверхні рани посилює грануляцію, діє бактерицидно, антиоксично, фунгіцидно.

Цинку оксид проявляє в'яжучу, підсушуючу та дезінфікуючу дії.

Лізол проявляє протизапальну, бактерицидну та інсектицидну дії.

Вазелін та ланолін у препараті виконують функцію маzewої основи.

Застосування

Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, собак, котів, кролів, птиці (курей) при трихофітії, екземах, дерматитах та інших захворюваннях шкіри; ураженнях копит при некробактеріозі, копитній гнілі у овець; саркоптозі (корості).

Дозування

Перед застосуванням мазь перемішують, оскільки при тривалому зберіганні можливе розшарування компонентів, що входять до її складу. Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри і на 2-4 см навколо них, без попереднього видалення лусочок і вистригання шерсті; при цьому її злегка втирають у шкіру. Уражені ділянки обробляють 1-2 рази на добу до відокремлення лусочок. Якщо через 4-5 днів лусочки не відокремилися, втирання мазі продовжують. Як правило, через 7-10 днів уражені ділянки звільняються від лусочок і на них спостерігається ріст волосся.

Після завершення обробки проводять контрольні мікроскопічні дослідження зіскобів. При виявленні збудника хвороби лікування продовжують.

Протипоказання

Немає.

Застереження

Немає.

Форма випуску

Туби з полімерних матеріалів по 20, 50, 90 г; контейнери з полімерних матеріалів по 20, 50, 90, 250, 500 г і 1 кг.

30.09.2020

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі від 0°C до 25°C.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400

vetnöhöuse

МОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1