Додаток 2
до реєстраційного посвідчення АА-06831-01-17

Клавасептін таблетки зі смаком печінки 62,5 мг для собак та котів
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис
Довгасті таблетки бежевого кольору з роздільною борозенкою.
Склад
1 таблетка (62,5 мг) препарату містить діючі речовини:
амоксицилін (як амоксициліну тригідрат) - 50,0 мг,
кислоту клавуланову (калію клавуланат) - 12,5 мг.
Допоміжні речовини: коричневий оксид заліза Е172, кросповідон, повідон К25, диоксид кремнію, целюлоза мікрокристалічна, аромат печінки, аромат дріжджей, магнію стеарат, хіпромелоза.

Фармакологічні властивості
АТС vet класифікаційний код QJ01- антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01CR02 – Амоксицилін та інгібітор ферменту.

Амоксицилін – це напівсинтетичний амінопеніцилін (β-лактамний антибіотик), що володіє широким спектром протимікробної дії. Механізм дії полягає у порушенні синтезу клітинної стінки бактерій, що приводить до лізису бактеріальної клітини, а саме коли β-лактамні антибіотики вільно проходять через пептидогліковий шар у грампозитивних бактерій та гідрофобний бар'єр у грамнегативних бактерій до цитоплазматичної мембрани.

Одним із шляхів виникнення резистентності до антибіотиків є вироблення бактеріями ензимів (β-лактамаз), які руйнують β-лактамне кільце антибіотика раніше, ніж він подіє на бактеріальну клітину. Кислота клавуланова інактивує β-лактамазу бактеріальної клітини і, тим самим, відновлює чутливість бактерії до бактерицидної дії амоксициліну у концентраціях, які легко досягаються у тканинах тварин після введення препарату.

Препарат активний проти багатьох грампозитивних та грамнегативних бактерій, включно з продуцентами β-лактамази: *Staphylococcus spp., Clostridium spp., Actinomyces bovis, Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Streptococcus spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Moraxella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp.*

Амоксицилін та клавуланова кислота залишаються стабільними в присутності шлункового соку, не змінюючись під впливом шлункового та кишкового вмісту. Обидва компоненти швидко всмоктуються та дифундують в більшість тканин та рідин організму, за виключенням головного мозку та спинномозкової рідини, в які амоксицилін проникає лише при запаленні мозкових оболонок. Більша частина амоксициліну виділяється з сечею в незміненому вигляді. Приблизно 15% від введеної дози клавуланової кислоти виділяється з сечею протягом перших 6 годин.

Застосування
Лікування котів та собак при захворюваннях шкіри (включаючи лікування глибокої та поверхневої піодермії), м'яких тканин, ротової порожнини (наприклад, гінгівіт), сечовивідних шляхів, органів дихання (включаючи захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів), травного каналу (ентерити), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну та клавуланової кистоти.

Дозування
Перорально у дозі 10 мг амоксициліну та 2,5 мг клавуланової кислоти на 1 кг маси тіла, двічі на добу, тобто 1 таблетка на 5 кг маси тіла двічі на добу.

Маса тіла тварини, кг	Дозування (кількість таблеток двічі на прийом, двічі у добу)
1,0- 2,5	½
2,6- 5,0	1

5.1- 7,5	1 ½
7,6 - 10,0	2

Курс лікування:

- 7 діб при лікуванні періодонтальних захворювань у собак
- 7 діб при лікуванні хвороб шкіри (включаючи рани) у котів.

У випадку важкої інфекції після застосування препарату протягом 7 діб потрібна консультація ветеринара щодо подовження терміну терапії ще на 7 діб.

Протипоказання

Підвищена чутливість до пеніцилінів та інших β-лактамів, до будь-яких допоміжних речовин.

Препарат не застосовувати коням, кролям, мурчакам, хом'якам, шиншилам та дрібним травоїдним тваринам.

Не застосовувати тваринам з серйозним порушенням функції нирок , що супроводжується анурією та олігурією

Не застосовувати одночасно з хлорамфеніколом, антибіотиками групи цефалоспоринів, тетрациклінів, макролідів.

Застереження

Застосовувати препарат тваринам у період вагітності та лактації, рекомендують тільки тоді, коли користь від препарату переважає можливі ризики за рішенням лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Ламіновані алюмінієві блістері по 10 таблеток, у картонних коробках по 20, 50, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 та 1000 таблеток.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 10 ºС до 25 ºС.

Термін придатності - 2 роки.

Невикористану половинку таблетки потрібно використати протягом 16 годин.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Ветоквінол С.А.
Магні-Вернуа, БП 189,
Ф-70204, Люр, Седекс
Франція

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois, BP 189,
F-70204, Lure, Cedex
France

Виробник готового продукту

Ветоквінол С.А.
Магні-Вернуа, БП 189,
Ф-70204, Люр, Седекс
Франція

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois, BP 189,
F-70204, Lure, Cedex
France

Ветоквінол Біовет Сп. з о.о.
13-14 Косінієров Гдинських вул., 66-400 Гожув Влкп.
Польща

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
13-14 KosynierowGdynskichst.
66-400 Gorzow Wlkp.
Poland

petitouse