

08.10.2021

КАНІВЕРМ таблетки
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Овальні, двоопуклі таблетки світло-жовтого кольору в крапинку з лінією для розлому з обох сторін.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини: фенбендазол – 214,0 мг; пірантелу памоат (ембонат) – 206,0 мг; празіквантел – 71,0 мг.

Допоміжні речовини: лактоза моногідрат, мікрокристалічна целюлоза, магнію стеарат, тальк, повідон К 90, кремнезем колоїдний, картопляний крохмаль, ароматизатор «Сардина».

Таблетки препарату випускають масою по 0,7 г та по 0,175 г.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати

Широкий спектр антигельмінтної дії на круглі і стьожкові гельмінти ґрунтується на фармакологічній дії складових препарату: фенбендазол, пірантелу памоат, празіквантел.

Фенбендазол (група бензімідазолів) гальмує полімеризацію білків тубулінів в мікротубуліни, знижує активність енергетичних ферментів, що викликає загибель паразитів від виснаження.

Має високу антигельмінтну активність і широкий спектр дії, знищує личинки зрілих нематод, деякі види цестод, трематод і їхні яйця.

Пірантел памоат (ембонат) (група тетрагідропіримідинів) активний проти нематод (круглі гельмінти), впливає на їх холінергічні рецептори, що призводить до незворотного спастичного паралічу паразитів.

Празіквантел активний проти цестод (стьожкові гельмінти), підвищує проникливість мембран для іонів кальцію, викликає підвищення м'язової активності, яке змінюється скороченням мускулатури та спастичним паралічем, викликає руйнування зовнішнього покриву цестод дорослих форм.

КАНІВЕРМ таблетки за ступенем дії на організм належить до малотоксичних речовин (4 клас безпечності).

У рекомендованих дозах немає сенсibilізуючої, ембріотоксичної і тератогенної дії.

Застосування

Дегельмінтизація собак і котів при ураженні круглими і стьожковими гельмінтами: *Toxocara canis*, *T. cati*, *T. leonine*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoms caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.*

Дозування

Перорально таблетки задають тваринам окремо або перемішують з кормом у дозах: цуценята, малі собаки і коти:

- 1 таблетка (0,175 г) на 0,5-2 кг маси тіла;
- 0,5 таблетки (0,7 г) або 2 таблетки (0,175г) на 2-5 кг маси тіла;

середні собаки:

- 1 таблетка (0,7 г) або 4 таблетки (0,175 г) на 5-10 кг маси тіла;

великі собаки:

- 1 таблетка (0,7 г) на кожні 10 кг маси тіла.

Не задавати препарат тваринам одночасно з молочним кормом. Таблетки для тварин у розплідниках можна подрібнити і згодовувати з рубленим м'ясом у дозах відповідно до маси тіла. Дегельмінтизацію цуценят та кошенят можна проводити, починаючи з 3-12 тижневого віку. Одноразову дозу задають з інтервалом у три тижні і потім кожні три місяці.

Протипоказання

Не можна застосовувати ослабленим і хворим тваринам (особливо при цистицеркозі

08.10.2021

очей, нейроцистицеркозі спинного мозку), тваринам із захворюваннями печінки.

Застереження

Побічна дія

У тварин при сильних інвазіях через декілька годин після введення препарату можуть спостерігатися такі побічні дії як блювота, підвищення температури, алергічний сип, розм'якшення фекалій. Ці симптоми виникають внаслідок загибелі гельмінтів в організмі тварин, а не внаслідок дії препарату. Препарат може викликати у тварин сонливість.

Особливі застереження при використанні

Цуценятам та кошенятам препарат КАНІВЕРМ таблетки можна застосовувати, починаючи з 3-12 тижневого віку.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Дозу препарату потрібно уважно враховувати для вагітних тварин.

Період виведення (каренції)

Не регламентують.

Форма випуску

Таблетки масою по 0,7 г випускаються у алюмінієвих блістерах по 2, 6, 100 таблеток. Таблетки масою по 0,175 г випускаються у алюмінієвих блістерах по 2, 6, 100 таблеток.

Зберігання

Зберігати препарат у закритому заводському упакованні у сухому, захищеному від світла, місці за температури не вище 25°C.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту:

Біовета, а.с.

Коменского 212

683 23 Івановіце на Гане, Чехія

Bioveta, a.s. (Czech Republic)

Komenskeho 212

683 23 Ivanovice na Hane