

АМІНОВІТОЛ



Розчин для перорального застосування.

СКЛАД	1,0 мл кормової добавки містить діючі речовини: вітамін А – 2500 МО; вітамін В₁ – 1,2 мг; вітамін В₂ – 4,5 мг; вітамін В₆ – 2,5 мг; вітамін В₁₂ – 0,01 мг; вітамін С – 30,0 мг; вітамін D₃ – 2250 МО; вітамін Е – 10 МО; вітамін К₃ – 4,5 мг; фолієву кислоту – 0,25 мг; пантотенову кислоту – 9,0 мг; біотин – 0,05 мг; нікотинамід – 22,0 мг; холін хлорид – 50,0 мг; метіонін – 10,0 мг; аргінін – 10,0 мг; лейцин – 12,0 мг; треонін – 2,0 мг; триптофан – 6,0 мг; лізин – 50,0 мг; валін – 22,0 мг; ізолейцин – 8,0 мг; фенілаланін – 10,0 мг; гістидин – 6,0 мг. Допоміжні речовини: пропіленгліколь, декстроза, спирт етиловий, вода очищена.
-------	--

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	АМІНОВІТОЛ — кормова добавка, що має сукупні фармакологічні властивості окремих вітамінів та амінокислот, які сприяють нормалізації обміну речовин в організмі, підвищенню його резистентності до впливу несприятливих умов. АМІНОВІТОЛ покращує зовнішній вигляд шерсті, шляхом підсилення обмінних процесів у волосяних цибулинах. Препарат покращує стан перових фолікулів та якість оперення. АМІНОВІТОЛ поповнює дефіцит вітамінів в організмі, підтримує організм при стресових ситуаціях. Сприяє швидкому відновленню після лікування.
-------------------------------	--

ЗАСТОСУВАННЯ	Для доповнення раціону, собак, котів, декоративних кролів, дрібних гризунів, папуг, канарок вітамінами, амінокислотами при стресових станах, які викликані паразитарними або інфекційними захворюваннями, транспортуванням, змінами раціону годівлі. Для покращення стану організму після дегельмінтизації.
--------------	---

ДОЗУВАННЯ

Кормову добавку застосовувати не менше 7 діб поспіль.
Препарат застосовують перорально з питною водою у дозі:

Вид тварин	Добова доза крапель на 1 тварину на добу	Спосіб застосування	Курс
Собаки (від 10 кг)	20	Розвести у невеликому об'ємі води і випоїти індивідуально або додати до поїлки.	1 раз на добу впродовж 7-10 діб
Собаки (до 10 кг), коти, декоративні кролі	10		
Дрібні гризуни, папуги, канарки	1-2	Розвести в добовому об'ємі води (дати до поїлки)	

Щодобово слід готувати свіжий розчин препарату.

ПРОТИПОКАЗАННЯ	Не застосовувати тваринам та птиці, корми яких збалансовані за вітамінами та амінокислотами.
----------------	--

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ	Слід дотримуватися загальноприйнятих правил особистої гігієни та техніки безпеки, які передбачені при роботі з кормовими добавками. Невикористаний продукт або його залишки мають бути утилізовані згідно з чинними вимогами.
---	---

ФОРМА ВИПУСКУ	Флакон-крапельниця з полімерних матеріалів по 10 мл.
---------------	--

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ- ВАННЯ	Суше, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 5 до 25 °С.
---	---

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	36 місяців. Після розведення у питній воді — 24 години.
-----------------------	--

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!

ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ:	МПА Ветеринарі Медісінс енд Едітівс С.Л. Могода, 16-18-Полігон Індастріал Кан Сальвателла 08210 08210 Барбера дель Валлес, Барселона, Іспанія
---	--

ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ:	МПА Ветеринарі Медісінс енд Едітівс С.Л. Могода, 16-18-Полігон Індастріал Кан Сальвателла 08210 08210 Барбера дель Валлес, Барселона, Іспанія Вироблено на замовлення: ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» вул. Володимирська, 57-А, 08600 м. Васильків, Київська область, Україна
-----------------------------------	--