

САНОДЕРМ
(крем)
листівка-вкладка

Опис

Крем білого або майже білого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини:

бетаметазону дипропіонату

(у перерахунку на 100% речовину) - 0,64 мг;

гентаміцину сульфату

(у перерахунку на безводний гентаміцин) - 1 мг;

клотримазолу

(у перерахунку на 100% речовину) - 10 мг.

Допоміжні речовини: метилпарабену (метилпарагідроксibenзоату) (Е 218) – 2 мг, пропіленгліколь, динатрію едетат (трилон Б), олія мінеральна, парафін білий м'який, спирт цетостеариловий, поліетиленгліколу (макроголу) цетостеариловий ефір, натрію дигідрофосфат моногідрат, натрію гідрофосфат додекагідрат, вода очищена.

Фармакологічні властивості

Завдяки комбінації діючих речовин препарат має протизапальну, протиалергійну, антибактеріальну, протигрибкову дію.

Бетаметазону дипропіонат – синтетичний фтормісний кортикостероїд. Має протизапальну, глюкокортикоїдну, протиалергійну, протисвербіжну дію. Бетаметазон гальмує міграцію лейкоцитів, вивільнення лізосомальних ферментів і протизапальних медіаторів у вогнищі запалення, пригнічує фагоцитоз, зменшує судинно-тканинну проникність, перешкоджає утворенню запального набряку. Біотрансформується у печінці. Екскретується нирками, частково виділяється з молоком.

Клотримазол – належить до групи імідазольних протигрибкових лікарських засобів. Сприяє збільшенню проникності фосфоліпідної оболонки ліпосом, вакуолізації цитоплазми, зниження кількості рибосом. Активний по відношенню до: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*, *Candida albicans*, *Malassezia furfur* (*Pityrosporum orbiculare*).

Гентаміцин – антибіотик широкого спектру дії із групи аміноглікозидів, діє бактерицидно по відношенню до грамнегативних бактерій: *Pseudomonas aeruginosa*, *Aerobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Klebsiella pneumoniae*; грампозитивних бактерій: *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus aureus*.

При напшкірному застосуванні препарату Санодерм у терапевтичних дозах трансдермальне всмоктування діючих речовин у кров дуже низьке. Застосування оклюзійних пов'язок значно підвищує трансдермальне всмоктування бетаметазону і гентаміцину, що може призвести до збільшення ризику розвитку системних побічних ефектів.

Застосування

Для лікування собак та котів при дерматозах із вираженою алергічною, запальною реакцією, свербіжем, гіперемією, набряком, інфільтрацією ексудату, ускладнених вторинною бактеріальною інфекцією; грибкових захворюваннях шкіри: дерматофітії, викликаній *Microsporum canis*, *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, кандидозах, викликаних *Candida albicans*, *Candida parapsilosis*, ураженні дріжджовими грибами *Malassezia furfur*.

Дозування

Крем застосовують зовнішньо місцево. Перед нанесенням крему шерсть на ураженій ділянці вистригають. Крем необхідно наносити на уражені шкіру та оточуючі ділянки тонким шаром 2 рази на добу (вранці та увечері), обережно втираючи у шкіру; після досягнення покращення стану здоров'я тварини частота застосування препарату може бути зменшена до 1 разу на добу.

Тривалість лікування визначається ліквідацією запального процесу та негативними даними бактеріального та/або мікологічного аналізу, припиненням свербіжу, очищенням шкіри.

Курс лікування залежить від виду та важкості перебігу захворювання, ефективності терапії, визначається лікарем ветеринарної медицини і зазвичай стає 2-4 тижні (не більше); між повторними курсами необхідна перерва не менше 20 діб.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Побічна дія

Надмірне та тривале застосування препарату на значній ділянці ураження (відносно загальної площі поверхні тіла тварини) може призвести до прояву системних ефектів, властивих для застосування глюкокортикостероїдів, а саме: пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи із розвитком вторинної недостатності наднирників, прояву симптомів гіперкортицизму (збільшення маси тіла, набряки, гіпертензія, глюкозурія, гіпокаліємія), виникнення синдрому Іценко-Кушинга.

Застереження

Уникати потрапляння препарату в очі, відкриті рани.

Не наносити крем на шкіру навколо очей.

Форма випуску

Туба по 15 г. 1 туба в пачці.

Зберігання

В оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.

Термін придатності препарату – 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

ПАТ “Київмедпрепарат”

01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.