

2 6. 1 1. 2019

**Каніквантель® плюс**  
**(таблетки)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Круглі таблетки блідо-жовтого кольору із двома перехресними роздільними пасками із ароматом м'яса.

**Склад**

Одна таблетка (612 мг) містить діючі речовини:

празіквантел - 50,0 мг;

фенбендазол - 500,0 мг.

Допоміжні: натрію лаурил сульфат, повідон 25, стеарат магнію, спеціальний сухий ароматизатор м'яса.

**Фармакологічні властивості**

*ATCvet QP52A, протитрематодні, протинематодні і протицестодні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)*

Фармакологічні властивості препарату ґрунтуються на властивостях діючих речовин.

**Празіквантел** активний проти цестод (стьожкові гельмінти), підвищує проникливість мембран для іонів кальцію, викликає підвищенням'язової активності, яке змінюється скороченням мускулатури та спастичним паралічем, викликає руйнування зовнішнього покриву дорослих форм цестод. У деяких випадках стьожкові гельмінти під дією празіквантелу повністю перетравлюються і не виявляються у фекаліях.

**Фенбендазол** (група бензімідазолів) інгібує ферментну систему гельмінтів, що призводить до порушення енергетичного обміну та спричиняє загибель паразитів від виснаження. Має високу антигельмінтну активність і широкий спектр дії, знищує личинки зрілих нематод, деякі види цестод, трематод і їхні яйця.

**Застосування**

Дегельмінтизація собак та котів при ураженні:

нематодами – *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*;

цестодами – *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*

трематодами – *Opisthorchis felinus*, *Alaria alata*, *Pseudamphistomum truncatum*, *Echinochasmus perfoliatus*.

**Дозування**

Рекомендована доза - 5 мг празіквантелу та 50 мг фенбендазолу на 1 кг маси тіла.

Це відповідає 1 таблетці **Каніквантель® плюс** на 10 кг маси тіла.

Рекомендовані дози препарату **Каніквантель® плюс**:

<b>Вид тварин</b>	<b>Маса тіла, кг</b>	<b>Доза (таблетка)</b>
<b>Коти</b>	< 2	¼
	2 – 4	½
	> 4	¾
<b>Цуценята та собаки малих порід</b>	< 2	¼
	2 – 5	½
	5- 10	1
<b>Собаки середніх порід</b>	10 – 15	1½
	15 – 25	2
	25 - 30	3
<b>Собаки великих порід</b>	30 – 40	4
	40 - 50	5

Таблетки згодують тваринам примусово або з кормом. Попередньо голодної дієти або особливого режиму годівлі не потрібно.

2 6. 1 1. 2019

При лікувальній дегельмінтизації рекомендується повторне застосування препарату через 3 доби. Профілактичну дегельмінтизацію проводять 1 раз у квартал.

**Протипоказання**

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати цуценятам та кошенятам віком до 3-х тижнів.

**Застереження**

При роботі з препаратом необхідно дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

**Форма випуску**

Блістери (PVC) по 12 таблеток, упаковані у картонні коробки.

**Зберігання**

Зберігають препарат у сухому темному місці, в упакованні виробника при температурі не вище 25 °С.

**Термін придатності**

4 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення**

ЛОКСАВЕТ фарма ГмбХ  
Макс-Планк-Штрассе, 11,  
Д-85716, Унтершляйсхайм,  
Німеччина

LOXAVET pharma GmbH  
Max-Planck-Strasse, 11,  
D-85716, Unterschleissheim  
Germany

**Назва і місце знаходження виробника**

Хаупт Фарма Берлін ГмбХ  
Моосрозенштрассе 7, 12347, Берлін, Німеччина

Haupt Pharma Berlin GmbH (Germany)  
Moosrosenstraße, 7, 12347 Berlin