

22.02.2024

**Сінулокс® таблетки з приємним смаком 250 мг
(таблетки)
листівка-вкладка**

Опис

Рожеві плоскі круглі таблетки зі скошеними краями.

Таблетка має лінію розлому на одній стороні та вигравіруваний «SYNULOX» на іншій.

Склад

1 таблетка (масою 875 мг) препарату містить діючі речовини (мг):

амоксцилін (як тригідрат) - 200,0 мг,

кислоту клавуланову (як калію клавуланат) - 50,0 мг.

Допоміжні речовини: барвник Еритрозин (Е 127), магнію стеарат, натрію гліколят крохмальний тип А, діоксин кремнію колоїдний безводний, дріжджі сухі, целюлоза мікрокристалічна.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01CR02 – Амоксицилін та інгібітор ферменту.

Амоксицилін – це напівсинтетичний амінопеніцилін (β-лактамний антибіотик). Він порушує синтез бактеріальної клітинної стінки шляхом інгібування ензимів транспептидази та карбоксипептидази, що викликає осмотичний дисбаланс та загибель бактерії у фазі росту.

Резистентність до багатьох β-лактамних антибіотиків спричинена властивістю бактерій виробляти ензим (β-лактамазу), який утворює комплекси з антибіотиками, руйнуючи їх β-лактамне кільце та викликаючи інактивацію антибіотику. Клавуланат калію інактивує β-лактамазу, що забезпечує швидку бактерицидну дію амоксициліну проти чутливих до нього мікроорганізмів.

Препарат є активним проти багатьох грампозитивних, включно з β-лактамазо-продукуючими штамами: *Staphylococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Peptostreptococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, та грамнегативних бактерій, включно з β-лактамазо-продукуючими штамами: *Bacteroides spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Campylobacter spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*.

Препарат неефективний проти інфекцій, викликаних видами *Pseudomonas spp.*.

Амоксицилін та клавуланова кислота залишаються стабільними в присутності шлункового соку, не змінюючись під впливом шлункового та кишкового вмісту. Обидва компоненти швидко всмоктуються та дифундують у більшість тканин та рідин організму, за виключенням головного мозку та спинномозкової рідини, в які амоксицилін проникає лише при запаленні мозкових оболонок. Більша частина амоксициліну виділяється з сечею в незмінному вигляді. Приблизно 15% від введеної дози клавуланової кислоти виділяється з сечею протягом 6 годин.

Застосування

Лікування котів та собак при захворюваннях шкіри (включаючи лікування глибокої та поверхневої піодермії), м'яких тканин (абсцеси та анальний сакуліт), ротової порожнини (наприклад, гінгівіт), сечовивідних шляхів, органів дихання (включаючи захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів), травного каналу (ентерити), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну та клавуланової кислоти.

Дозування

Перорально в дозі 12,5 мг препарату (що еквівалентно 10 мг амоксициліну та 2,5 мг клавуланової кислоти) на 1 кг маси тіла, двічі на добу. Якщо тварина відмовляється від добровільного прийому, можна подрібнену таблетку задавати разом з їжею.

Для більшості інфекцій, включаючи захворювання шкіри, сечовивідних шляхів та травного каналу, приведена доза є ефективною. У тяжких випадках захворювань органів дихання показник ефективності лікування був кращим при збільшенні дози до 25 мг/кг маси тіла, двічі на добу.

Тривалість терапії:

Звичайні випадки, включаючи всі показання - в більшості випадків терапія триває 5-7 діб.

22.02.2024

Хронічні або тяжкі випадки. У випадках, при яких спостерігається значне ураження тканин, більш довгий курс терапії може бути застосовано до повного відновлення уражених тканин.

Рекомендована тривалість лікування:

- хронічні хвороби шкіри - 10-12 діб;
- хронічні цистити - 10-28 діб;
- хвороби органів дихання - 8-10 діб.

Протипоказання

Підвищена чутливість до пеніцилінів. Препарат не застосовувати кролям, мурчакам, хом'якам чи іншим дрібним травоядним тваринам. Не застосовувати тваринам з серйозним порушенням функцій нирок. Не застосовувати одночасно з хлорамфеніколом, антибіотиками групи цефалоспоринов, тетрациклінів, макролідів.

Застереження

Побічна дія

Дуже рідко в тварин, які отримували препарат, можуть виникати реакції гіперчутливості до пеніцилінів.

Вживання продукту може призвести до дуже рідкісних випадків розладів травного каналу (блювання, діарея, анорексія).

Особливості застереження при використанні

Перед застосуванням препарату рекомендовано зробити тест на чутливість мікроорганізму-збудника захворювання до діючих речовин препарату.

Застосування під час вагітності і лактації

Може застосовуватись вагітним тваринам та в період лактації.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Пеніциліни та цефалоспоринов можуть спричиняти гіперчутливість (алергію) після ін'єкції, інгаляції, споживання чи контакту зі шкірою. Гіперчутливість до пеніцилінів може призводити до виникнення перекресних реакцій з цефалоспоринов та навпаки. Алергічні реакції на ці речовини можуть бути серйозними.

Якщо відомо про підвищену чутливість до амоксициліну, не можна працювати з такими препаратами. Застосовувати препарат необхідно з обережністю. Якщо відбувся контакт з препаратом і з'явилися симптоми алергії (почервоніння шкіри), необхідно звернутись за консультацією до лікаря. Свербіж у ділянці морди, очей чи губ, важке дихання є більш серйозними симптомами і потребують негайної медичної допомоги. Дуже рідко можуть бути прояви шлунково-кишкових розладів (блювота, діарея, анорексія). Після роботи з препаратом необхідно мити руки.

Форма випуску

Таблетки по 5х2 штук у ламінованому алюмінієвому блістері, по 10, 100 чи 500 таблеток в картонній упаковці.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 10 до 25 °С.

Термін придатності - 2 роки

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Зоетіс Інк.,
10 Сільван Вей, Парсіппані,
Нью Джерсі 07054,
США

Zoetis Inc.,
10 Sylvan Way, Parsippany,
New Jersey 07054,
USA

Виробник готового продукту

Хаупт Фарма Латіна еС. ар. ел.,
Страда Статале 156 Деї Монті Лепіні
Км 47, 600, Латіна, 04100, Італія

Haupt Pharma Latina S.r.l.
Strada Statale 156 Dei Monti Lepini
Km 47,600, Latina, 04100, Italy