

# Діа~~ДОГ~~ & КЕТ

Інструкція щодо належного використання додаткового корму

**Додатковий корм у вигляді таблеток для жування**

**Склад:** гідролізований тваринний білок (борошно з печінки птиці) (22,29%), декстроза (22,21%), м'якоть яблучна, сушена (17,92%), пектин (6,37%), хлорид натрію (3,81%), борошно з лущеного рису (3,0%), м'якоть цитрусових (лімонів), сушена (2,74%), продукти від переробки трав (лушпиння насіння подорожника) (2,28%), дріжджі пивні (1,50 %), бікарбонат натрію (1,25%), хлорид калію (1,20%), яєчні продукти, сухі (яєчний порошок) (0,50%), оксид магнію (0,13%).

**Поживні речовини:** сирий протеїн (17,0%), сира зола (13,2%), олія та жир (5,6%), сира клітковина (5,5%), натрій (1,9%), калій (1,2%).

**Кормові добавки на 1 кг:** кремнієва кислота (Е 551а), суміш стеатитів і хлоридів (Е 560), целюлоза мікрокристалічна (Е 460), акація (гуміарафік) (Е 414) – 108.000 мг; монтморилоніт-Іліт (1g557) – 40.000 мг.

**Вміст вологи:** не більше 10,4%.

**Властивості:** додатковий корм містить легкозасвоювані поживні речовини, глукозу. Додатковий корм містить збалансовану суміш інгредієнтів природного походження та може використовуватися для збалансування добового раціону за поживністю, в тому числі при гострих порушеннях всмоктування у кишечнику (діареї). Спричиняє значне гелеутворення у травному каналі, що сприяє виведенню грудок шерсті (трихобезоар) у котів.

**Рекомендовано:** в якості додаткового корму при гострих розладах кишкової абсорбції (діареї); сприяє виведенню трихобезоар з травного каналу у котів і собак.

**Вид тварин:** собаки, коти.

**Рекомендації щодо годування:**

**Собаки**

Таблетку змішують з кормом або дають тварині безпосередньо у дозі (на 1 тварину):

тварини масою тіла до 10 кг – по 1/2 таблетки двічі на добу;

тварини масою тіла до 20 кг – по 1 таблетці двічі на добу;

тварини масою тіла понад 20 кг – по 1 таблетці тричі на добу.

**Коти**

Таблетку змішують з кормом, дають тварині безпосередньо або по дрібнюють чи розчиняють у воді та дають примусово за допомогою шприца у дозі (на 1 тварину):

тварини масою тіла до 3 кг – по 1/2 таблетки 1 раз на добу;

тварини масою тіла понад 3 кг – по 1 таблетці 1 раз на добу.

Протягом застосування додаткового корму необхідно забезпечити тварині вільний доступ до питної води.

**Рекомендована тривалість годування:** 5 діб.

**Пакування:** 1 таблетка по 5 г у саше, по 60 таблеток в картонній пачці.

**Номер партії:** (вказано на упаковці).

**Дата виготовлення:** (вказано на упаковці).

**Мінімальний строк зберігання:** 36 місяців від дати виготовлення.

**Умови зберігання:** зберігати в сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від 15 °C до 25 °C.

**Назва і місцезнаходження виробника:**

Сапплексан ГмбХенд Ко. Кг (Німеччина) Мароммерштрассе, 21, 22850, Нордерштедт, Гамбург Supplexan GmbH & Co. Kg (Germany)

Marommerstraße, 21, 22850, Norderstedt, Hamburg

Реєстраційний номер потужності: DE SH 1 60007.

**На замовлення:** ПАТ «Київмедпрепарат» (Україна) 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139

**Найменування та адреса оператора ринку, відповідального за маркування (Імпортер):**

ПАТ «Київмедпрепарат» (Україна) 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 044 490 75 22

Експлуатаційний дозвіл на потужність № td-UA-26-6