

07.09.2023

**PerFect® ГЛОБАЛ для собак**  
**(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору зі специфічним запахом складників.

**Склад**

1 мл препарату містить діючі речовини:

імідаклоприд - 100,0 мг;

моксидектин - 25 мг.

Допоміжні речовини: бутилгідрокситолуол, пропілен карбонат, бензиловий спирт.

**Фармакологічні властивості**

**АТС vet: QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування (QP53AX17 – імідаклоприд, QP54AB02 – моксидектин).**

PerFect® ГЛОБАЛ для собак – це ендо- та ектопаразитицид місцевого застосування.

Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин: імідаклоприду та моксидектину.

**Імідаклоприд** [1-(6-хлоро-3-піридилметил)-N-нітро-імідазолідин-2-іліденамін]] – ектопаразитицид, що належить до класу нітрометилєн-гетероциклічних сполук. Група хімічного складу інсектоакарицидів – неонікотиніди. Імідаклоприд має високу спорідненість до нікотинових ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи (ЦНС). Він взаємодіє з нікотинергічним рецептором ектопаразита, розміщеним на постсинаптичному нейроні, порушує передачу нервового імпульсу по ньому, та призводить до паралічу та загибелі ектопаразита. Через слабку взаємодію з нікотиновими рецепторами ссавців та низький рівень проникнення через їх гематоенцефалічний бар'єр, діюча речовина практично не впливає на ЦНС ссавців.

**Моксидектин** – макроциклічний лактон другого покоління з класу мільбеміцинів є напівсинтетичним похідним немадектину, який представляє собою продукт ферментації з бактерії *Streptomyces cyanogriseus* (підвиду *noncyanogenus*). Моксидектин діє на багатьох екто- та ендопаразитів. Він активний щодо нематод травного каналу і дихальних шляхів, а також мікродирофілярій (стадії L3, L4) *Dirofilaria spp.* Механізм його дії обумовлений взаємодією з гамма-аміномасляною кислотою і глутаровими хлорними каналцями паразитів, що призводить до відкриття хлорних каналців у постсинаптичному просторі і збільшення іонів хлору, внаслідок чого відбувається незворотне зниження м'язової активності, параліч та загибель паразитів.

Після нанесення препарату на шкіру тварини, імідаклоприд швидко розповсюджується по поверхні шкіри тварин впродовж однієї доби. Сліди імідаклоприду залишаються на шкірі протягом усього періоду лікування.

Моксидектин всмоктується через шкіру, досягаючи максимальної концентрації у плазмі крові у період між 4-9 добами після обробки тварини і повільно виділяється з плазми протягом місяця.

Препарат має стійку дію і захищає тварину після одноразового застосування протягом 4 тижнів від повторного зараження паразитами.

07.09.2023

### Застосування

Лікування та профілактика собак при змішаних паразитарних інвазіях:

| Показання до застосування собакам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Лікування | Профілактика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Сифонаптерози: блохи ( <i>Ctenocephalides spp.</i> , <i>Pulex irritans</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +         | +            |
| Ентомози: волосії ( <i>Trichodectes canis</i> ), воші ( <i>Linognathus setosus</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +         |              |
| Акарози: вушний кліщ - отодектоз ( <i>Otodectes cynotis</i> ), короста собак- саркоптоз ( <i>Sarcoptes scabiei</i> var. <i>canis</i> ), демодекоз ( <i>Demodex canis</i> )                                                                                                                                                                                                                         | +         |              |
| Круглі гельмінти травного каналу: токсокароз ( <i>Toxocara canis</i> - личинки L4, дорослі і молоді форми), токскарроз ( <i>Toxascaris leonine</i> - личинки L4, дорослі і молоді форми), анкілостомоз ( <i>Ancylostoma caninum</i> - дорослі і молоді форми), унцинаріоз ( <i>Uncinaria stenocephala</i> - дорослі і молоді форми), трихуроз ( <i>Trichuris vulpis</i> - дорослі і молоді форми). | +         |              |
| Стронгілятози дихальних шляхів: креносомоз ( <i>Crenosoma vulpis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +         |              |
| Філяріатози: дирофіляріоз (знищення циркулюючих мікрофілярій <i>Dirofilaria spp.</i> личинки L3 та L4)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +         | +            |
| Стронгілятози: ангіостронгільоз ( <i>Angiostrongylus vasorum</i> , в тому числі личинки L4 та незрілі)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +         | +            |
| Спіруратози: спіроцеркоз ( <i>Spirocercalupi</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | +            |

Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні алергічного блошиного дерматиту (flea allergy dermatitis: FAD).

### Дозування

Препарат застосовують шляхом крапельного (точкового) нанесення на суху непошкоджену шкіру в недоступному для злизування тваринам місці (між лопатками). Мінімальна рекомендована доза для собак становить 0,1 мл на 1 кг маси тіла тварини (еквівалентно імідаклоприду - 10 мг/кг маси тіла, моксидектину - 1,0 мг/кг маси тіла). Мінімальний терапевтичний інтервал становить 4 тижні.

Перед застосуванням препарату рекомендується зважити тварину, а вміст флакону добре струсити. Кришка флакона містить піпетку-дозатор. Вміст піпетки-дозатора наносять краплями згідно дозування.

**Флакон** об'ємом 1,7 мл: флакон 1,7 мл розрахований на обробку тварин вагою 17 кг. Для тварин меншої ваги доза розраховується наступним чином: 1 крапля препарату з піпетки - дозатора (1 крапля дорівнює 0,03 мл) - на 300 г маси тіла тварини або 1 повне натисення на ковпачок піпетки-дозатора (містить 8 крапель) - на 2,5 кг маси тіла тварини.

**Флакон** об'ємом 2,8 мл: флакон 2,8 мл розрахований на обробку тварин вагою 28 кг. Для тварин меншої ваги доза розраховується наступним чином: 1 крапля препарату з піпетки- дозатора - на 300 г маси тіла тварини або 1 повне натисення на ковпачок піпетки-дозатора і (містить 8 крапель) - на 2,5 кг маси тіла тварини.

**Флакон** об'ємом 5,0 мл: флакон 5,0 мл розрахований на обробку тварин вагою 50 кг. Для тварин меншої ваги доза розраховується наступним чином: 1 крапля препарату з піпетки - дозатора - на 300 г маси тіла тварини або 1 повне натисення на ковпачок піпетки-дозатора (містить 8 крапель) - на 2,5 кг маси тіла тварини.

07.09.2023

Залишок препарату у флаконі може бути використаний для наступної обробки тварини.

Розділити шерсть тварини між лопатками, щоб видно було шкіру. Притиснути кінець піпетки безпосередньо до шкіри і видавити вміст піпетки декількома натисканнями в одне або два місця. При обробці великих тварин препарат наносити у декілька місць вздовж хребта, від холки до хвоста. Для запобігання злизування препарату, собаці надягають намордник або комір з картону.

*Лікування і профілактика ураження блохами (Stenoccephalides spp., Pulex irritans).*

Одноразове застосування препарату запобігає майбутньому зараженню блохами протягом 4 тижнів. Доцільно поєднувати обробку тварин з обробкою місць утримання тварин та підстилок з метою переривання життєвого циклу бліх у навколишньому середовищі.

При комбінованому лікуванні блошиного алергічного дерматиту препарат застосовують щомісяця.

*Лікування ураження волосоїдам (Trichodectes canis), ураження вошами (Linognathus setosus).*

Препарат наносять одноразово. Рекомендується ветеринарний огляд через 30 діб після застосування препарату, оскільки в деяких випадках необхідна повторна обробка.

*Лікування вушної корості - отодектозу (Otodectes cynotis)*

Препарат наносять одноразово. Рекомендується ветеринарний огляд через 30 діб після застосування препарату, оскільки в деяких випадках необхідна повторна обробка. Не застосовувати безпосередньо у вушний канал.

*Лікування корості собак - саркоптозу (Sarcoptes scabiei var. canis).*

Препарат наносять двічі, по 1 дозі з інтервалом 4 тижні.

*Лікування демодекозу (Demodex canis).*

Обробку препаратом проводять кожні 4 тижні впродовж 2-4 місяців, що призводить до помітного покращення стану тварини, у випадках легкого та помірного ступеню тяжкості. Особливо тяжкі випадки можуть потребувати більш тривалого лікування, а саме: препарат застосовують 2-4 рази з інтервалом 1 раз на тиждень. В усіх випадках лікування продовжують до тих пір, поки результати 2 послідовних щомісячних лабораторних досліджень будуть негативними (зішкребки зі шкіри). У випадках, коли після лікування препаратом протягом 2-х місяців у тварини не спостерігається покращення, застосування препарату припиняють і призначають за рекомендацією лікаря ветеринарної медицини альтернативне лікування.

Оскільки демодекоз у собак часто ускладнюється піодермією, дерматомікозами, необхідно проводити комплексне лікування, спрямоване на нормалізацію функції шкіри, гормонального статусу, поліпшення росту шерсті, посилення імунних реакцій.

*Лікування ураження круглими гельмінтами (нематодозів) травного каналу: токсокарозу (Toxocara canis), токскаррозу (Toxascaris leonina), анкілостомозу (Ancylostoma caninum), унцинаріозу (Uncinaria stenocephala), трихуриозу (Trichuris vulpis).*

Препарат застосовують щомісячно.

*Профілактика дирофіляріозу серця, легеневої артерії, інших кровоносних судин (D. immitis) та дирофіляріозу підшкірної клітковини (D. Repens).*

Слід враховувати, що тварини можуть бути заражені статевозрілими формами гельмінтів. Для профілактики дирофіляріозу препарат застосовують щомісячно в один і той самий день протягом року. Препарат починають застосовувати за 1 місяць до першої очікуваної появи кровосисних комах (комарі різних родів: *Anophelex*, *Culex*, *Aedex*) і припиняють через 1 місяць після закінчення сезону комах. При переході з іншого

07.09.2023

препарату проти дирофіляріозу на «PerFect® ГЛОБАЛ для собак» перше його нанесення слід робити через 1 місяць після останнього застосування попереднього препарату.

*Лікування при ураженні мікрофіліаріями (D. immitis)*

Препарат наносять щомісяця протягом 2 місяців поспіль.

*Лікування при ураженні мікрофіліаріями (D. repens)*

Препарат наносять щомісяця протягом 4 місяців поспіль.

*Лікування та профілактика ангіостронгілозу (Angiostrongylus vasorum)*

Препарат наносять одноразово. Рекомендується ветеринарний огляд через 30 діб після застосування препарату, оскільки в деяких випадках необхідна повторна обробка.

*Лікування креносомозу (Crenosoma vulpis).*

Одноразове застосування.

### **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість тварини до складових компонентів препарату.

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати препарат цуценятм віком до 7 тижнів та масою тіла менше 1 кг.

Не застосовувати препарат вагітним або лактуючим самкам.

При лікуванні отодектозу не вводити препарат безпосередньо у вушний канал.

Не наносити препарат на вологу або пошкоджену шкіру тварини.

Не застосовувати препарат одночасно з іншими інсектоакарицидними засобами та макроциклічними лактонами (івермектин, селамектин, дорамектин, мільбеміцин).

### **Застереження**

Перед застосуванням препарату необхідно уважно прочитати листівку-вкладку.

Препарат містить моксидектин, тому необхідно з обережністю обробляти собак таких порід як коллі, шелті, бобтейл, велика англійська вівчарка та порід близьких до них.

Особи із гіперчутливістю до складників препарату повинні наносити препарат з обережністю користуючись гумовими рукавичками.

Препарат необхідно наносити лише на неущкоджену шкіру.

Не допускати контакту щойно обробленої тварини з іншими тваринами до повного висихання шкіри.

Під час обробки тварин не можна курити, пити і приймати їжу.

Під час обробки тварин препаратом уникати попадання препарату на відкриті ділянки шкіри, слизові оболонки, в очі.

При роботі з препаратом дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Після роботи з препаратом необхідно ретельно вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки або очі необхідно ретельно промити їх проточною водою.

Щойно обробленим тваринам не можна дозволяти спати в одному ліжку з власником.

Після обробки тварин препаратом не допускати їх до маленьких дітей впродовж 24 годин.

Розчинник, що входить до складу «PerFect® ГЛОБАЛ для собак», може залишати плями та псувати такі матеріали як шкіра, тканини, пластик та інші. Якщо тварини утримуються у квартирі і мають доступ до меблів, то після обробки їх необхідно утримувати окремо до повного висихання препарату на шкірі.

Часте використання шампуню після обробки тварин зменшує ефективність препарату.

07.09.2023

При виникненні ознак побічної дії після застосування препарату необхідно припинити подальше використання препарату і звернутися до лікаря ветеринарної медицини.

**Форма випуску**

Флакони зі скла або полімерні по 1,7 мл; 2,8 мл; 5 мл, укупорені кришкою-крапельницею та запаковані у картонні коробки.

**Зберігання**

Зберігати препарат у сухому захищеному від світла місці, за температури від 10 °С до 25 °С, у місцях, недоступних для дітей та тварин, окремо від харчових продуктів та кормів.

**Термін придатності**

24 місяці.

Після першого відбору з флакону препарат необхідно зберігати в темному місці за температури від 10 до 25°С протягом 90 діб.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ветсинтез»  
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

**Виробник готового продукту**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ветсинтез»  
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна