

АНТИГЕЛЬМ TRIO
(таблетка для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Таблетки округлої або серцеподібної форми від білого до жовтого кольору, зі специфічним запахом.

Склад

Одна таблетка (масою 800 мг) містить діючі речовини:

фенбендазол – 200 мг;

пірантелу памоат (ембонат) – 144 мг;

празіквантел – 50 мг.

Допоміжні речовини: крохмаль картопляний, стеарат кальцію, ароматизатор, лактоза.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати, ATC-vet QP52AA01 – празіквантел. QP52AF02 – пірантел, комбінації)

Препарат «АНТИГЕЛЬМ TRIO» – комбінований препарат, до складу якого входять фенбендазол, пірантелу памоат та празіквантел. Широкий спектр антигельмінтної дії на різні стадії розвитку круглих та стьожкових гельмінтів у собак та котів ґрунтується на фармакологічних властивостях складових препарату.

Фенбендазол (група бензімідазолів) гальмує полімеризацію білків тубулінів у мікротубуліни, в результаті чого порушуються надходження і внутріклітинне транспортування поживних речовин (аденозинтрифосфornoї кислоти і глюкози), що викликає загибель паразитів від виснаження.

Фенбендазол має універсальну антигельмінтну дію проти нематод, цестод, трематод травного каналу та дихальних шляхів, а також виявляє овоцидну дію (знищує яйця гельмінтів), знижує зараження пасовищ та місця виходу собак, зменшує вірогідність перезараження тварин.

Фенбендазол часто є основним засобом лікування лямбліозів у собак. Фенбендазол перешкоджає організації мікротрубочок у клітині паразита та перешкоджає виведенню клітинних відходів і поглинанню поживних речовин. Клітини паразита досить швидко виснажуються, і паразит гине.

Фенбендазол не виявляє кумулятивної, ембріотоксичної, мутагенної та алергічної дії, належить до малотоксичних речовин.

При пероральному введенні фенбендазол всмоктується в травному каналі і проникає в органи і тканини. Виводиться з організму переважно з сечею та фекаліями у незміненому вигляді або у вигляді метаболітів.

Пірантелу памоат (група тетрагідропіримідинів) активний проти нематод молодих і статевозрілих, впливає на їх холінергічні рецептори, що призводить до незворотного спастичного паралічу паразитів. Пірантелу памоат майже не всмоктується із кишківника і завдяки цьому пролонгується його антигельмінтна дія. Виводиться з організму переважно в незміненому вигляді (до 93%) з фекаліями.

Комбінація діючих речовин *фенбендазолу та пірантелу*, що входять до складу препарату, мають синергічну дію проти нематод у собак та котів: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria spp.*, *Trichuris vulpis*, а також проти лямблій *Giardia spp.*

Празіквантел – є похідним піразинізохінолонів, активний проти цестод і трематод у собак та котів: *Taenia species*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Mesocystoides spp.*, *Diphyllobotrium latum*, *Opisthorchis felinus*, *Alaria alata*. Празіквантел дуже швидко всмоктується поверхнею паразита і поширюється по його організму. Вивчення *in vitro* та *in vivo* доводить, що празіквантел руйнує зовнішній покрив (тегумент) паразита. Це є майже миттєве тетанічне стискування мускулатури паразита і швидка

вакуолізація тегументу (оболонки). Це швидке стиснення пояснюється зміною проникності клітинних мембран паразита для двовалентних катіонів, особливо кальцію. Деполяризація нейром'язових гангліоблокаторів, порушення транспорту глюкози і мікротубулярної функції у цестод призводить до порушення м'язової інервації, паралічу і загибелі паразита.

Після перорального застосування празиквантел швидко абсорбується майже повністю з травного каналу та досягає максимальної концентрації в плазмі крові через 1-3 години. Його біодоступність становить біля 80%. Празиквантел метаболізується в інактивні форми у печінці і виділяється в жовч. Виводиться з організму через 48 годин з сечею та у незначній кількості з фекаліями.

Препарат у рекомендованих дозах не має сенсibilізуючої, ембріотоксичної і тератогенної дії.

Застосування

Дегельмінтизація собак та котів при ураженні:

нематодами (личинкові, молоді та статевозрілі стадії) – *Toxocara canis*, *Toxocara cati* (syn. *Toxocara mystax*), *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma* spp., *Uncinaria* spp., *Trichuris vulpis*, *Strongyloides stercoralis*;

цестодами (преімагінальні та імагінальні стадії) – *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Echinococcus* spp., *Mesocostoides* spp.

трематодами – *Opisthorchis felinus*, *Alaria alata*, *Pseudamphistomum truncatum*, *Echinochasmus perfoliatus*.

Дозування

Рекомендована доза – 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини (20 мг фенбендазол, 14,4 мг пірантелу памоату та 5 мг празиквантелу на 1 кг маси тіла).

Дози препарату, залежно від маси тіла:

Маса тіла тварини, кг	Кількість таблеток, шт
1-2,5	1/4
>2,5-5	1/2
>5-10	1
>10-15	1 1/2
>15-20	2
>20-30	3
>30-40	4
>40-50	5

Таблетки згодують тваринам з кормом або примусово. Попередньо голодної дієти або особливого режиму годівлі не потрібно.

Таблетки можуть ділитися на половини і четвертину для тварин із меншою масою тіла ніж 10 кг.

Лікувальну дегельмінтизацію тварин проводять одноразово. При необхідності, за показами повторити через 10-14 діб.

Профілактичну дегельмінтизацію тварин проводять один раз на квартал у терапевтичній дозі, а також перед паруванням та за 12-14 діб перед вакцинацією.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не застосовувати цуценятам віком до 4-х тижнів.

Не застосовувати кошенятам віком до 6-х тижнів.

Не застосовувати самкам за один тиждень до родів та впродовж двох тижнів після родів.

Не застосовувати хворим на інфекційні хвороби, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати тваринам з порушеннями функції нирок і печінки.

Не застосовувати препарат одночасно з похідними піперазину, левамізолом, фосфорорганічними сполуками і іншими лікарськими засобами з холінергічною дією.

Застереження

Препарат застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Слід дотримуватися рекомендованих доз.

Клінічних ознак передозування при застосуванні препарату у рекомендованих дозах не спостерігається.

Препарат можна застосовувати самкам у період лактації за умови досягнення цуценятами 4-х тижневого віку та кошенятами 6-ти тижневого віку.

При збільшенні рекомендованої дози у 3-5 разів у собак та при застосуванні впродовж періоду, який вдвічі довший від рекомендованого, не виникає ніяких клінічних ознак передозування.

Коти є більш чутливими і при передозуванні можливі симптоми: пригнічення, блювота, діарея, які швидко зникають без застосування терапевтичних засобів. Спеціальних антидотів немає.

Форма випуску

Пакети по 1 таблетці. Вторинна упаковка – картонні коробки по 20 пакетів з таблетками.

Блістери по 10 таблеток, упаковані разом із листівкою-вкладкою у картонну коробку.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей та тварин, місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна