

Коротка характеристика продукту

1. Назва

ГЕПАСАН-ВС

2. Склад

1 мл кормової добавки містить діючі речовини:

L-карнітину гідрохлорид - 25,0 мг;

Сорбітол - 200,0 мг;

Магнію сульфат гептагідрат - 50,0 мг;

Холіну хлорид 75% - 146,1 мг;

Бетаїну гідрохлорид - 25,0 мг;

L-аргінін - 15,0 мг.

Допоміжні речовини: натрію бензоат, вода очищена.

3. Фармацевтична форма

Розчин.

4. Фармакологічні властивості

Кормова добавка «ГЕПАСАН-ВС» - гепатопротектор, що має сукупні фармакологічні властивості окремих складових із вираженою стимулюючою, захисною та жовчогінною дією на печінку, які покращують її функції та метаболізм, оптимізуючи основні фізіологічні процеси.

L-карнітину гідрохлорид - пришвидшує метаболічні процеси, продукт біосинтезу лізину та метіоніну. L-карнітин бере участь у розщепленні надлишків жирних кислот, посилюючи їх окиснення і транспортування до мітохондрій, відіграє важливу роль у транспортуванні ацетилкоензиму А, підвищує використання енергетичних джерел клітинами, сприяє нормалізації обміну речовин в організмі.

Сорбітол – енергетична речовина, накопичується в печінці у формі глікогену, частково компенсує негативний енергетичний баланс, має виражений сечогінний ефект.

Магнію сульфат сприяє виведенню токсинів із організму, збільшує секрецію жовчі і травних ферментів, посилює перистальтику кишечника, поповнює організм іонами магнію.

Холіну хлорид (вітамін В4) – ефективний гепатопротектор, який запобігає жировій інфільтрації печінки та є важливим джерелом металічних груп, необхідних для біохімічних процесів, що відбуваються в організмі. Холіну хлорид входить до складу фосфоліпідів, які сприяють синтезу біологічних мембран і активації ферментних процесів.

Бетаїн є природним джерелом метильних груп і гепатопротектором, що позитивно впливає на обмін речовин і покращує стан епітелію кишечника, забезпечує більш повне засвоєння енергії раціону, підвищує стійкість до стресів, має жовчогінну і липотропну дію, активує метаболічне метилювання в печінці та синтез фосфоліпідів клітинних мембран.

L-аргінін - стимулює клітинний метаболізм, сприяє знешкодженню та виведенню аміаку, регулює рівень цукру в крові й знижує молочнокислий ацидоз, обумовлений м'язовим навантаженням, активує систему азотовмісних ферментів, синтезує нітрозогрупу, забезпечуючи необхідний тонус артерій.

Застосування кормової добавки призводить до підвищення витривалості організму, поліпшення функції серця, зменшення підшкірного жиру, збільшення м'язової маси за рахунок пришвидшення обмінних процесів у клітинах, покращення проникнення до клітин вітамінів, мінералів та виведення продуктів розпаду. Кормова добавка зменшує ризик виникнення жирової дистрофії печінки, нефрозу, міокардозу, запобігає виникненню стресів (теплого, транспортного та ін.), підвищує апетит та засвоєння кормів, покращує травлення та всмоктування жирів, що особливо важливо у період інтенсивного росту тварин і птиці.

5. Клінічні особливості

5.1 Види тварин

Коні, велика рогата худоба (телята), кози, вівці, свині, птиця, кролі.

5.2 Покази до застосування

Для детоксикації печінки, пришвидшення її відновлення у періоди інтенсивного перевантаження, нормалізації обміну речовин, підвищення загальної резистентності та

продуктивності, профілактики стресів, пришвидшення росту при відгодівлі телят, кіз, овець, свиней, коней, птиці, кролів.

5.3 Протипоказання

Не встановлені.

5.4 Побічна дія

Не має.

5.5 Особливі застереження при використанні

Не має.

5.6 Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Згідно із дозуванням.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не виявлені

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Кормову добавку «ГЕПАСАН-ВС» застосовують перорально впродовж 5-10 діб у дозах:

телята на відгодівлі - 0,5-1мл/л рідкого корму;

вівці, кози, свині, коні, кролі - 0,5-1мл/л питної води;

птиця - 0,5-0,75 мл/л питної води.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не має

5.10 Спеціальні застереження для кожного окремого виду тварин

Не має.

5.11. Період виведення (каренції)

Не визначається.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил.

6.0 Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності

Не змішувати з вакцинами, які випоюють з водою.

6.2 Термін придатності

2 роки.

Термін придатності після першого відкривання первинної тари за дотримання умов зберігання - 28 діб.

6.3 Особливі заходи зберігання

Сухе темне місце за температури від 5 до 25°C.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Флакони із нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1 по 10, 20 і 100 мл.

Полімерні флакони (каністри) по 1 і 5 л, 10, 20, 25 л.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками.

Не використовувати залишки кормової добавки, або кормову добавку, у якій закінчився термін дії.

Продукт утилізують шляхом спалювання у спеціальній печі.

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Телефон/факс: +38 (057) 757-84-71; +38 (057) 714-37-51

E-mail: info@vetsintez.com, www.vetsintez.com

8. Назва та місцезнаходження виробника (виробників)

ТОВ "Ветсинтез"

Україна, 61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Телефон/факс: +38 (057) 757-84-71; +38 (057) 714-37-51

E-mail: info@vetsintez.com, www.vetsintez.com

9. Додаткова інформація