

АНТИ ЦИСТИТ
(таблетки)
листівка–вкладка

Опис

Таблетки круглої форми, в цукровій оболонці жовтого кольору, зі специфічним запахом складових.

Склад:

одна таблетка для котів та собак з масою тіла до 10 кг містить діючі речовини (мг) :

нітроксоліну – 12,6;

дротаверину гідрохлориду – 10,2.

Допоміжні речовини: екстракт хвоща польового трави – 5,1 мг, екстракт валеріани – 5,1 мг, екстракт листя кропиви – 5,1 мг, екстракт ялівцю – 5,1 мг, екстракт коріння солодки – 5,1 мг, екстракт листя брусниці – 2,55 мг, екстракт ромашки – 2,55 мг, тальк, альбумін (яєчний білок), кальцію стеарат, полівінілпірролідон, глюкоза, мікрोकристалічна целюлоза, цукор молочний, сорбіт, цукрова оболонка.

Одна таблетка для котів та собак з масою тіла більше 10 кг містить діючі речовини (мг) :

нітроксоліну – 25,2;

дротаверину гідрохлориду – 20,4.

Допоміжні речовини: екстракт хвоща польового трави – 10,2 мг, екстракт валеріани – 10,2 мг, екстракт листя кропиви – 10,2 мг, екстракт ялівцю – 10,2 мг, екстракт коріння солодки – 10,2 мг, екстракт листя брусниці – 5,1 мг, екстракт ромашки – 5,1 мг, тальк, альбумін (яєчний білок), кальцію стеарат, полівінілпірролідон, глюкоза, мікрोकристалічна целюлоза, цукор молочний, сорбіт, цукрова оболонка.

Фармакологічні властивості

Таблетки «АНТИ ЦИСТИТ» відносяться до комбінованих протимікробних лікарських препаратів та мають протимікробну, протизапальну, спазмолітичну, діуретичну та салуретичну дію.

Нітроксолін є похідним 8-оксихіноліну. Нітроксолін селективно інгібує синтез бактеріальної ДНК, утворюючи комплекси з металовмісними ферментами мікробної клітини і запобігаючи їх зв'язуванню з специфічним субстратом. Це призводить до бактеріостатичної, бактерицидної та фунгіцидної дії.

Нітроксолін активний щодо широкого спектра грампозитивних, грамнегативних бактерій і деяких грибів, що викликають інфекції сечовивідних шляхів, в тому числі *Staphylococcus spp.*, *Ureaplasma urealyticum*, *Corynebacterium spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.* Після прийому всередину нітроксолін швидко всмоктується зі шлунково-кишкового тракту. Виводиться нирками в незмінному вигляді. В сечі визначаються незмінно високі концентрації нітроксоліну.

Дротаверину гідрохлорид чинить тривалу спазмолітичну, міотропну та судинорозширювальну дію, усуває спазми гладеньких м'язів сечовивідних шляхів і тенезми сечового міхура. Метаболізм препарату відбувається в печінці. За 72 години практично виводиться з організму, приблизно 30% з сечею, а 50% - з калом. Велика частина виводиться у вигляді метаболітів, у незміненому вигляді в сечі не визначається.

Комплекс біологічно активних речовин лікарських рослин (флавоноїди, ефірні олії, дубильні речовини, вітаміни, мінеральні сполуки) володіє антисептичними, сечогінними спазмолітичними та протизапальними властивостями, сприяє виведенню конкрементів при сечокам'яній хворобі.

АНТИ ЦИСТИТ таблетки за ступенем впливу на організм відносяться до малонебезпечних речовин та в рекомендованих дозах не мають місцевопоздражуючої та сенсibiliзуючої дії.

Застосування

Препарат застосовують котам та собакам для лікування гострих та хронічних запальних та інфекційних захворювань сечовивідних шляхів (цистит, пієлонефрит,

уретрит), сечокам'яної хвороби, профілактики інфекцій при проведенні діагностичних процедур та у післяопераційний період після видалення сечових конкрементів у котів та собак.

Дозування

Таблетки застосовують тваринам індивідуально з кормом або вводять безпосередньо на корінь язика з лікувальною метою 3 рази на добу протягом 7-14 днів, в наступних дозах:

Маса тіла тварини (кг)	Кількість таблеток АНТИ ЦИСТИТ (разова доза)	
	Таблетка для котів та собак з масою тіла до 10 кг	Таблетка для котів та собак з масою тіла більше 10 кг
≤ 5	1	-
5-10	1+1/2	-
≥ 10	2	1
10-20	-	1+1/2
20-30	-	Від 1+1/2 до 2
30-40	-	Від 2 до 3
> 40	-	Від 3 до 4

Слід уникати пропуску чергової дози препарату, бо це може призвести до зниження ефективності лікування.

Тривалість курсу застосування лікарського препарату а також зміни у дозуванні визначає лікар ветеринарної медицини в залежності від стану тварини, важкості та перебігу захворювання.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого в компонентів препарату (у тому числі в анамнезі). У разі виникнення підвищеної індивідуальної чутливості до препарату, його використання припиняють і у разі необхідності призначають симптоматичні засоби.

Не застосовувати тваринам з ознаками гострої серцевої, ниркової та печінкової недостатності.

Не застосовувати при виявленні резистентних штамів збудників.

Не застосовувати з профілактичною метою.

Не застосовувати ослабленим та виснаженим тваринам!

Застереження

У окремих тварин при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів препарату, можлива слинотеча.

Симптоми передозування у тварин не виявлені.

Вагітним та лактуючим тваринам, цуценят та кошенят препарат призначати після консультації з лікарем ветеринарної медицини.

При роботі з препаратом слід дотримуватися загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, що передбачені при роботі з лікарськими засобами для тварин.

Форма випуску

Таблетки у блистерах по 10 штук, блистери по 1, 2, 3 або 5 штук в упаковці. Банки полімерні по 20, 30 або 50 таблеток. Вторинна упаковка- картонна коробка.

Умови зберігання

Препарат зберігати в оригінальній упаковці за температури від 5 ° до 25 ° С, окремо від харчових продуктів і кормів, в сухому, захищеному від світла та вологи, недоступному для дітей місці.

Термін придатності

Термін придатності - 3 роки.

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "Ветсинтез"

вул. Смольна, 30, м. Харків, Україна, 61001

Виробник готового продукту:

ТОВ "Ветсинтез"

вул. Смольна, 30, м. Харків, Україна, 61001

pethouse