

ВЕТОФЛОК

краплі очні та вушні
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого або світло жовто-зеленого кольору зі специфічним запахом складових.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

офлоксацин – 3,0 мг.

Допоміжні речовини: бензалконію хлорид, натрію тіосульфат, трилон Б, натрію хлорид, гідроксипропілметилцелюлоза, кислота соляна, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01- антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01MA01 - Офлоксацин.

Офлоксацин - антибіотик групи фторхінолонів, що активний проти грамнегативних мікроорганізмів, а саме: *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Proteus* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Camphylobacter* spp., *Yersinia* spp., *Pseudomonas aeruginosa*., *Vibrio* spp., *Aeromonas* spp., *Haemophilus* spp., *Serratia* spp., *Chlamydia* spp.. Активний щодо деяких грампозитивних мікроорганізмів, зокрема *Staphylococcus* spp.(включаючи пеніциліназо- продукуючі та метицилін-стійкі штами), *Streptococcus* spp. Помірно чутливі до офлоксацину *Enterococcus faecalis*, *Pseudomonas* spp., *Streptococcus pneumoniae*. До препарату також чутливі: *Brucella* spp., *Mycoplasma* spp., *Mycobacterium* spp..

Механізм дії офлоксацину полягає в інгібуванні бактеріальної ДНК-гірази (топоізомерази II), що зупиняє процес спіралізації та синтез ДНК.

Значною перевагою препарату порівняно з іншими антибіотиками місцевої дії є його висока проникність до рогівки і передньої камери ока. З усіх фторхінолонів офлоксацин має найкращу здатність до проникнення у рогівку і передню камеру ока, його ефективна концентрація у сльозовій плівці зберігається навіть через 4 години (240 хвилин) після застосування та MIC90 становить вище 2 мкг/мл.. Системна реабсорбція після місцевого введення у кон'юнктивальний мішок є незначною і не має клінічної значущості.

Закапування офлоксацину в ухо в разі інтактною барабанної перетинки супроводжується мінімальним поглинанням в середньому вусі. Однак, поглинання офлоксацину збільшується при перфорації барабанної перетинки. Після закапування офлоксацину дорослим тваринам при перфорації барабанної перетинки максимальна концентрація в сироватці крові становить 10 нг/мл.

При місцевому застосуванні офлоксацину терапевтична концентрація досягається в тканинах ока через 30-60 хвилин.

Після 10 діб застосування препарату у терапевтичних дозах, концентрація офлоксацину у сироватці крові була у 1000 разів меншою за стандартну концентрацію при пероральному прийомі.

Застосування

Лікування собак, котів, дрібних декоративних тварин (декоративних кролів, хом'яків, щурів, мишей, мурчаків, папуг, канарок) при гострих та хронічних запаленнях очей і вух, які є наслідком бактеріального, хімічного або травматичного впливу — кон'юнктивіт, блефарит, кератокон'юнктивіт, ірит, іридоцикліт, дакриоцистит, кератит, ерозії рогівки, хламідійна інфекція

очей, захворювання очей після травм, потрапляння чужорідних тіл чи агресивних сполук, у перед- та післяопераційні періоди, а також лікування зовнішнього та середнього отиту, отореї, зокрема спричинених стороннім втручанням.

Дозування

При лікуванні очей препарат закапують перші 2 дні у кон'юнктивальний мішок по 1-2 краплі кожні 2-4 години, а потім – 4 рази на добу, при хламідійних інфекціях- 5 разів на добу.

При лікуванні захворювань вух препарат закапують у слуховий прохід по 1-4 краплі (залежно від маси тварини) 2-4 рази на добу до повного зникнення ознак запалення.

За наявності значних гнійних або слизисто-гнійних виділень проводять попередню гігієнічну обробку очей або вух, після чого закапують препарат.

Лікування повинне тривати до повного зникнення симптомів та додатково ще 2-3 доби. Курс лікування до повного одужання становить 5-10 діб.

Не слід торкатися кінчиком наконечника крапельниці до будь-якої поверхні, щоб уникнути забруднення вмісту флакона.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату (у тому числі в анамнезі).

Не застосовувати одночасно місцево з тетрациклінами, макролідами, лінкозамидами, хлорамфеніколом.

Під час лікування офлоксацином слід уникати надмірної дії сонячних променів або ультрафіолетового випромінювання.

Не застосовувати при вірусних та грибкових ураженнях очей і вух. Не застосовувати коням.

Не застосовувати одночасно з теофіліном, а також з препаратами, що містять катіони магнію, алюмінію і кальцію, які, зв'язуючись з офлоксацином, перешкоджають його адсорбції.

Не застосовувати при виявленні резистентних штамів збудників.

Застереження

Препарат застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

При закапуванні в очі інколи можливі місцеві ознаки дискомфорту, подразнення, свербіння, слезовиділення, які швидко проходять, зрідка — алергічні реакції. Обережно застосовувати тваринам віком до 7 днів та вагітним тваринам.

Форма випуску

Флакони полімерні або скляні з кришкою крапельницею по 10 мл запаковані у картонні коробки.

Зберігання

Зберігають препарат у сухому, темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Після першого відбору з флакону, препарат необхідно використати протягом 30 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!