

3 1. 0 5. 2021

МАЗЬ КОЛАФЛОКС

(мазь)

листівка-вкладка

Опис

Однорідна мазеподібна маса від білого до жовтуватого кольору.

Склад

100 г препарату містить діючі речовини:

метилурацил - 3 г;

енрофлосаксин - 1 г.

Допоміжні речовини: ПЕГ-1500, ПЕГ-400, гліцерин, колагеназа, вода очищена.

Фармакологічні властивості

АТСvet QD06 – антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для місцевого застосування.
QD06AX99 – Інші антибіотики для місцевого застосування, комбінації.

Енрофлосаксин належить до групи фторхінолонів. Він ефективний проти грампозитивних (*Staphylococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae* та інші) та грамнегативних (*E. coli*, *Salmonella typhimurium*, *Haemophilus paragallinarum*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.*, *Klebsiella spp.*) бактерій, а також проти мікоплазм (*Mycoplasma spp.*). Механізм дії енрофлосаксину полягає в інгібуванні ферментів бактеріальної клітини ДНК-гірази і топоізомерази IV, що приводить до порушення поділу бактеріальних клітин. Діє бактерицидно на грамнегативні мікроорганізми в період спокою і поділу, на грампозитивні мікроорганізми – у період поділу.

За ступенем впливу на організм енрофлосаксин відноситься до помірно небезпечних речовин.

Метилурацил (2,4-діоксо-6-метил-1,2,3,4-тетрагідро-піримідин) регулює метаболічні процеси, прискорює процеси регенерації, сприяє загоєнню ран, підвищує рівень місцевого імунітету, має протизапальний ефект. Чинить фотозахисну дію при фотодерматозах.

Поліетиленоксидна основа адсорбує рановий ексудат. Препарат легко проникає у тканини без пошкодження біологічних мембран, транспортує зв'язані з поліетиленгліколем метилурацил та енрофлосаксин. Мазь проявляє сильні дегідратуючі властивості, завдяки чому сприяє зменшенню перифокального набряку та очищенню рани від гнійно-некротичного вмісту.

Застосування

Лікування у коней, собак, котів, декоративних кролів та шиншил у першу фазу ранового процесу інфікованих ран, опіків, місцевих гнійно-запальних процесів, відморожень, гнійно-некротичних виразок в ділянці пальців, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до енрофлосаксину.

Дозування

Препарат наносять тонким шаром на пошкоджену поверхню шкіри або на марлеву серветку, а також використовують для перев'язки (при необхідності попередньо проводять первинну хірургічну обробку рани) 1-2 рази на добу. Перев'язки здійснюють щодня до повного очищення ран від гнійно-некротичних мас до появи грануляцій.

Тривалість лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання. Рекомендований курс лікування – 14 діб.

Протипоказання

Підвищена чутливість до фторхінолонів та/або метилурацилів.

Застереження

Особливі застереження при використанні

Якщо препарат застосовують котам, слід стежити за твариною та не допускати злизування мазі.

Використання під час вагітності, лактації

31.05.2021

Доцільність застосування препарату слід вирішувати індивідуально після консультації зі спеціалістом з ветеринарної медицини.

Форма випуску

Туби ламінатні з полімерних матеріалів по 50 г.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності препарату - 2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

08030, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, Україна
www.ukrzoovet.com.ua

Виробник готового продукту:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

08030, Київська обл., Бучанський р-н,
с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, Україна
www.ukrzoovet.com.ua