



ГЕПАТОЛІК суспензія для перорального застосування (рідкий премікс)

Інструкція по застосуванню

Опис

Суспензія від світло-коричневого до темно-коричневого кольору зі специфічним запахом складників.

Склад

1 мл преміксу містить:

соняшниковий фосфатидний концентрат - 100 мг,

метіонін - 100 мг,

аргінін - 50 мг,

бетаїн - 50 мг,

розторопші плямистої екстракт - 15 мг,

допоміжні речовини.

Властивості

ГЕПАТОЛІК містить специфічні нутрицевтичні компоненти, які мають мембраностабілізуючі, гепатопротекторні, антиоксидантні властивості. Комплекс складових біологічно активних речовин покращує функціональний стан печінки і її детоксикаційну функцію, сприяє збереженню та відновленню структури гепатоцитів; нормалізує рівень аміаку в організмі тварин, прискорює регенерацію клітин печінки.

Фосфатидний концентрат є основним компонентом преміксу, який в значній мірі містить так звані есенціальні фосфоліпіди, які представляють собою високоочищену фракцію фосфатидилхоліну. Есенціальні фосфоліпіди за своєю хімічною структурою подібні до ендогенних мембранних фосфоліпідів, переважаючи їх за своїми функціональними властивостями за рахунок високого вмісту в них поліненасичених жирних кислот, особливо лінолевої кислоти. Фосфоліпіди є основними структурними елементами клітинних мембран і органел.

Есенціальні фосфоліпіди - це мембранотропні сполуки з гепатопротекторними властивостями, які відновлюють клітинні мембрани, покращують метаболічні процеси в печінці, застосовуються для підтримки печінки за гепатопатій.

Метіонін – незамінна амінокислота, що бере участь у процесах переметилування. Проявляє ліпотропну дію, сприяє синтезу холіну, фосфоліпідів; бере участь у синтезі адреналіну, креатину; активує дію гормонів, вітамінів, ферментів. Має детоксикуючі властивості завдяки здатності метилувати токсичні продукти. Знижує концентрацію холестерину в крові і збільшує вміст фосфоліпідів.

Аргінін - амінокислота, яка бере участь у біосинтезі білка, в метаболізмі сечовини, сприяє виділенню кінцевих продуктів розпаду білка, посилює детоксикаційну функцію печінки. Аргінін є важливою складовою в процесі біосинтезу оксиду азоту (NO), здійснює регуляцію судинного тонуусу, сприяє підтриманню азотистого балансу, виведенню остаточного токсичного азоту, чинить антиоксидантну дію, нормалізує мікроциркуляцію в печінці, насичує її киснем, поліпшує показники гепатоportalної гемодинаміки. Аргінін також покращує внутрішньоклітинний обмін у гепатоцитах, стимулює їх активність, знижує утворення шкідливих для клітин печінки вільних радикалів, зменшує гіпоксію та запалення, сприяє регенерації гепатоцитів.

Бетаїн - ліпотропна речовина, яка бере участь у біосинтезі фосфоліпідів, транспорті тригліцеридів, окисненні та утилізації жирів. Запобігає виникненню та зменшує жирову дистрофію печінки. Бетаїн чинить антифібротичну, протизапальну дію, сприяє змен-



шенню рівня гомоцистеїну, запобігає ризику тромбоутворення та прогресування атеросклерозу.

Силімарин має гепатопротекторну дію завдяки конкурентній взаємодії з рецепторами на відповідні токсини в гепатоцитній мембрані, проявляючи, таким чином, мембраностабілізуючу дію, стимулює синтез протеїнів (структурних і функціональних) і фосфоліпідів в ушкоджених гепатоцитах, прискорюючи таким чином регенеративні процеси. Дія флавоноїдів, до яких належить силімарин, обумовлюється також їх антиоксидантними властивостями і ефектами, які покращують мікроциркуляцію. Завдяки своїм властивостям ГЕПАТОЛІК сприяє регенерації клітинних мембран, реактивує порушені мембранно-ферментні системи і рецептори, підвищує детоксикаційну здатність печінки і таким чином нормалізує її функцію.

Призначення

Премікс ГЕПАТОЛІК рекомендується задавати собакам і котам в якості додаткового джерела біологічно активних речовин для покращення роботи печінки; як додатковий компонент для відновлення клітин та мембрани печінки після ендо- та екзотоксикозів, соматичних і інфекційних захворювань, а також для зниження негативного впливу лікарських засобів, які мають гепатотоксичні властивості.

Спосіб введення та дозування

Перед кожним застосуванням премікс слід ретельно збовтувати!
Премікс застосовують собакам і котам перорально, індивідуально з невеликою кількістю корму або вводять примусово за допомогою шприца-дозатора 2-3 рази на добу, протягом 3-5 тижнів, в дозах, що вказані у таблиці:

Маса тіла тварини	Разова доза суспензії, мл	Добова доза суспензії, мл
Собаки		
до 10 кг	1	2 – 3
11 – 20 кг	2	4 – 6
21 – 30 кг	3	6 – 9
31 – 40 кг	4	8 – 12
від 41 і більше	5	10 – 15
Коти		
до 3 кг	1	2 – 3
3 – 6 кг	2	4 – 6
від 7 кг і більше	3	6 – 9

Попередження

Премікс не слід застосовувати тваринам з підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів, з ожирінням високого ступеню, з порушенням функції нирок, за гострого перебігу захворювань печінки (гепатит, дистрофія), за печінкової енцефалопатії.

Форма випуску

Флакони полімерні по 100 мл, укомплектовані шприцом-дозатором, укладені в картонні коробки.

Зберігання

В закритій упаковці виробника в сухому темному та недоступному для дітей місці, окремо від харчових продуктів за температурою від 2 до 25°C.
Термін придатності преміксу в закритій упаковці за дотримання умов зберігання - 2 роки з дня виготовлення, після відкриття флакона - не більше 21 доби.

Виробник готового продукту:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»,
вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка, Бучанський р-н.,
Київська обл., 08030, Україна.
www.ukrzoovet.com.ua

