

01.11.2024

ІЗІХЕЛС
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Двоопуклі таблетки з рискою по 0,15 г, плоскоциліндричні таблетки з рискою та фаскою по 0,45 та 0,9 г.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

фенібут – 166,7 мг.

Допоміжні речовини: МКЦ, сухий екстракт пустирника, цукрова пудра, кремнію діоксид колоїдний, кальцію стеарат.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QN06BX - Інші ветеринарні препарати, які виявляють психостимулювальну і ноотропну дію. QN06BX22- Фенібут.

Фенібут, що входить до складу препарату, є фенільним похідним ГАМК (гамма-аміномасляної кислоти) та фенілетиламіну. ГАМК – головний гальмівний нейромедіатор в центральній нервовій системі. Позитивно впливає на метаболічні процеси в нервових клітинах головного мозку.

Фенібут проявляє ноотропну активність, а як похідне ГАМК має анксиолітичну (транквілізуючу) дію. Не впливає на холіно- і адренорецептори. Посилюючи гальмівні ГАМК-ергічні процеси, впливає на функціональний стан за рахунок нормалізації метаболізму і впливу на мозковий кровообіг.

Фенібут має виражену стрес-коригуючу дію, забезпечує нормалізацію процесів збудження і гальмування в центральній нервовій системі.

Дослідження показали, що препарат може зменшувати занепокоєння, а також спричиняти легкий седативний ефект. В більш низьких дозах має м'який ефект фізичної та когнітивної стимуляції, у звичайних дозах та вищих проявляє седативну дію, сприяє глибокому та спокійному сну.

За застосування препарату не виявлено пригнічення дихання.

Фенібут швидко всмоктується після перорального введення та добре проникає у всі тканини організму, включаючи гематоенцефалічний бар'єр.

80-95% фенібуту метаболізується в печінці до неактивних метаболітів.

5% виводиться з організму нирками в незміненому вигляді..

Застосування

Препарат забезпечує нормалізацію процесів збудження і гальмування в центральній нервовій системі, сприяє нормалізації артеріального тиску і має кардіотонічну дію.

Препарат застосовують:

- для лікування собак та котів за поведінкових розладів, зокрема агресивного стану;
- для зниження збудження і корекції психогенних порушень поведінки у котів і собак у разі виникнення стресів (транспортування тварин, травми, грумінг, зміна раціону, зміна власника, гучні звуки, перебування у клініках, стаціонарах, притулках), фобій, агресії без видимих причин;
- для профілактики кінетозу (хвороби руху).

Дозування

Препарат застосовують котам і собакам 2 рази на добу через 15-30 хвилин після годування перорально на корінь язика, з урахуванням маси тіла (м.т.) тварини, в таких дозах:

- для котів 5 мг фенібуту на 1 кг м.т.;
- для собак 10 мг фенібуту на 1 кг м.т.

01.11.2024

Доза препарату становить 1 таблетка на тварину залежно від маси тіла тварини і маси таблетки, що відповідає:

Вид тварин	Маса тварини, кг*	Маса таблетки, г	Доза фенібуту, мг
Коти	5,0	0,15	25
Собаки дрібних порід	2,5		
Собаки середніх порід	7,5	0,45	75
Собаки великих порід	15,0	0,90	150

Примітка

* За потреби дозу коригують відповідно до фактичної маси тіла тварини.

Курс лікування становить 10-15 діб. За наявності ознак сильного збудження і психогенних порушень поведінки (агресія, страх, гіперактивність, надмірна вокалізація (гавкання, скавчання, нявкання) курс може бути продовжено до 20-ти діб. За поведінкових аномалій, пов'язаних з захворюваннями центральної нервової системи курс можна продовжити до 60-ти діб. Ефект від курсу в 10-15 діб зберігається менше 1-го місяця, ефект від тривалого курсу (до 60 діб) зберігається більше 1-го місяця.

У разі повторного прояву у тварин ознак збудження та/або порушень поведінки курс лікування препарату повторюють в тих самих дозах за наведеною схемою.

З метою профілактики стресів (транспортування, зміна середовища, відсутність хазяїна, участь у виставках і змаганнях) препарат застосовують за 5-7 діб до передбачуваного заходу і протягом 3-5 діб після його закінчення.

Для профілактики кінетозу (хвороби руху) препарат застосовують однократно у вищезгаданих дозах за 1-2 години до визначеного початку транспортування тварини. За появи блювання (виражених ознак кінетозу (хвороби руху)) прийом препарату малоефективний.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів препарату (у тому числі в анамнезі), гостра та хронічна ниркова недостатність, діабет, гіпертрофічна кардіоміопатія.

Не застосовувати вагітним та лактуючим самкам, окрім випадків преєклампсії та еклампсії.

Застереження

Побічна дія

За застосування препарату згідно з листівкою-вкладкою побічних реакцій не виявляли.

У поодиноких випадках, після першого введення препарату, у тварин може спостерігатися сонливість і нудота, які проходять самостійно і не потребують застосування лікарських засобів.

За підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату, можливі прояви збудження, сонливості, дратівливості, нудоти та алергічні реакції. У таких випадках проводять симптоматичну та десенсибілізуючу терапію.

У поодиноких випадках у чутливих тварин може виникнути дискомфорт у кишківнику та діарея з кровотечею в нижніх відділах травного каналу.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати препарат одночасно з депресантами, етанолом, бензодіазепінами, опіоїдами. Препарат спричиняє перехресну толерантність до всіх ГАМК-генних депресантів, тому після його введення депресанти можуть мати низьку ефективність.

01.11.2024

Передозування

Дані щодо передозування відсутні. Лише у дозі в 7-10 разів вище за середню терапевтичну препарат може проявляти гепатотоксичну дію.

Симптоми передозування: сонливість, нудота, блювання, запаморочення.

Спеціальні застереження

Перед застосуванням препарату виключити наявність у тварини інфекційних хвороб з нервовими розладами (сказ та інші).

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих під час роботи з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

ІЗІХЕЛС для котів та собак дрібних порід (таблетки по 0,15 г): по 20 таблеток в блістері, по 1 блістеру в пачці.

ІЗІХЕЛС для собак середніх порід (таблетки по 0,45 г): по 20 таблеток в блістері, по 1 блістеру в пачці.

ІЗІХЕЛС для собак великих порід (таблетки по 0,9 г): по 12 таблеток в блістері, по 2 блістери в пачці.

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності - 3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник РП та виробник готового продукту:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромстач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка, Бучанський р-н.,

Київська обл., 08030, Україна.

www.ukrzoovet.com.ua