

24. 12. 2024

Каніквантель® Плюс XL таблетки
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Таблетка продовгуватої форми з рискою, рожевого кольору із запахом м'яса.

Склад

1 таблетка (вагою 1270,6 мг) містить діючі речовини (мг):

празіквантел – 100,0;

фенбендазол – 1000,0.

Допоміжні речовини: натрію лаурил сульфат, повідон розчинний, кроскамелоza, заліза оксид червоний, магнію стеарат, спеціальний ароматизатор вегетаріанський (штучний аромат м'яса)..

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52A Антигельмінтні засоби (QP52AA51, празіквантел, комбінації).

Фармакологічні властивості препарату ґрунтуються на властивостях діючих речовин.

Празіквантел активний проти цестод (стьожкові гельмінти), підвищує проникливість мембран для іонів кальцію, викликає підвищення м'язової активності, яке змінюється скороченням мускулатури та спастичним паралічем, викликає руйнування зовнішнього покриву дорослих форм цестод. У деяких випадках стьожкові гельмінти під дією празіквантелу повністю перетравлюються і не виявляються у фекаліях.

При пероральному введенні празіквантел добре всмоктується в кишечнику, досягаючи максимальної концентрації крові через 1-4 години, зв'язується білками плазми (до 80%), піддається біотрансформації в печінці з утворенням неактивних моно- і полігидрооксілованих метаболітів. Виводиться з організму переважно з сечею, і в незначних кількостях - з фекаліями.

Фенбендазол (група бензімідазолів) інгібує ферментну систему гельмінтів, що призводить до порушень енергетичного обміну та спричиняє загибель паразитів від виснаження. Має високу антигельмінтну активність і широкий спектр дії, знищує личинки зрілих нематод, деякі види цестод, трематод і їхні яйця.

Після перорального введення фенбендазол всмоктується частково, метаболізується в печінці до сульфоксиду (оксфендазол) і далі - до сульфону (оксфендазол сульфону). Фенбендазол та його метаболіти розповсюджуються по органах і тканинах, досягаючи найвищої концентрації у печінці тварини. Виведення з організму відбувається переважно з фекаліями, незначною мірою - з сечею. Період напіввиведення з плазми крові становить від 12 до 18 годин у собак. Екскреція незміненого та метаболізованого фенбендазолу (> 90 %) з фекаліями, незначно з сечею та молоком.

Застосування

Дегельмінтизація собак при ураженні:

- **нематодами** – *Toxocara canis*, *Toxas caris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*;
- **цестодами** – *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*
- **трематодами** – *Opisthorchis felineus*, *Alaria alata*.

Дозування

Рекомендована доза становить - 5 мг празіквантелу та 50 мг фенбендазолу на 1 кг маси тіла тварини . Це відповідає 1 таблетці Каніквантель® плюс XL таблетки на 20 кг маси тіла тварини або половині таблеткам на 10 кг маси тіла.

Таблетки згодують тваринам примусово або з кормом. Попередньої голодної дієти або особливого режиму годівлі не вимагається.

Для лікування інфікованих собак рекомендується повторне введення препарату протягом 3 діб поспіль.

Для профілактики препарат слід застосовувати один раз у квартал.

Протипоказання

Підвищена чутливість до складових компонентів препарату.

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

24.12.2024

Не застосовувати цуценятам віком до 3-х тижнів.

Застереження

Побічних явищ та симптомів передозування при застосуванні препарату у рекомендованих дозах немає.

Форма випуску

Блістер ПВХ, вкритий алюмінієвою фольгою, що містить 3 таблетки.

Коробка з картону, що містить 1 блістер по 3 таблетки.

Зберігання

У сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей та тварин місці при температурі від 0 до 25 °С.

Термін придатності: 4 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

ЛОКСАВЕТ фарма ГмбХ
Макс-Планк-Штрассе, 11
Д-85716 Унтершляйсхайм, Німеччина
0049-89-88-90 01 90
0049-89-88-90 01 91
info@loxavet.com

LOXAVET pharma GmbH
Max-Planck-Strasse 11
D-85716 Unterschleissheim / Germany
+49 (0) 89 88 90 01 90
+49 (0) 89 88 90 01 91
info@loxavet.com

Виробник готового продукту:

ПАСТЕУР ФІЛІАЛА ФІЛІПЕСТІ С. А.
вул. Прінсіпала, 944, Філіпесті де Падуре,
район Прахова, Румунія
+40 745 102 945
petra.zaharia@farmavet.ro

PASTEUR FILIALA FILIPESTI S.A.
Str. Principala, Filipestii de Padure, judetul
Prahova
+40 745 102 945
petra.zaharia@farmavet.ro