



КОМБІХЕЛС краплі очні/вушні **(краплі очні та вушні, розчин)** листівка-вкладка

Опис

Розчин прозорий безбарвний стерильний.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини :

ципрофлораксацину гідрохлорид – 3,5 мг;

дексаметазон – 1,0 мг.

Допоміжні речовини: бензалконію хлорид, клептоза, манітол, натрію метабісульфіт трилон Б, вода для ін'єкцій, соляна кислота (для коригування рН).

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: QS03 – інші офтальмологічні та отологічні ветеринарні препарати.

Ципрофлораксацин – синтетичний антибактеріальний препарат групи фторхінолонів. За антибактеріальним спектром дії ципрофлораксацин подібний до інших фторхінолонів, але він приблизно у 3–8 разів активніший, ніж норфлораксацин. Механізм дії ципрофлораксацину полягає в інгібуванні бактеріальної ДНК-гірази (топоізомерази II), що, тим самим, зупиняє процес реплікації ДНК.

Ципрофлораксацин активний щодо грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів, а особливо проти *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Serratia spp.*, *Camphylobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Yersinia spp.*, *Vibrio spp.*, *Aeromonas spp.*, *Haemophilus spp.* До ципрофлораксацину також чутливі *Brucella spp.*, *Staphylococcus spp.* (включаючи пеніциліназо-продукуючі та метицилін-стійкі штамми), *Mycoplasma spp.*, *Mycobacterium spp.*

Дексаметазон – синтетичний фторований глюкокортикостероїд, який проявляє виражену протизапальну та протиалергічну дію. Взаємодіючи зі специфічним білковим рецептором в тканинах-мішенях, регулює експресію кортикоїд-залежних генів, впливаючи, таким чином, на синтез білка. Стабілізує лізосомальні ферменти мембран лейкоцитів, гальмує синтез кінінів, мітоз і міграцію лейкоцитів, інгібує синтез антитіл і порушує розпізнавання антигену. Всі ці ефекти беруть участь у пригніченні запальної реакції в тканинах у відповідь на механічне, хімічне або імунне пошкодження.

При закапуванні препарату у вухо або око абсорбція ципрофлораксацину є незначною. Ципрофлораксацин виводиться з організму із сечею.

Тривалість протизапальної дії дексаметазону після закапування 1 краплі препарату становить від 4 до 8 год. За місцевого застосування системна абсорбція є низькою. Після закапування в око дексаметазон добре проникає в епітелій рогівки і кон'юнктиви; при цьому в очній рідині утворюються терапевтичні концентрації. За запалення або ушкодження слизової ока швидкість penetрації збільшується. Невелика кількість дексаметазону надходить у системний кровотік. Близько 60–70% дексаметазону, що надходить в системний кровотік, зв'язується з білками плазми. Метаболізується дексаметазон у печінці під дією цитохромвмісних ферментів, метаболіти виводяться через кишківник. Період напіввиведення становить в середньому 3 години.

Застосування

Лікування собак і котів за інфекційно-запальних захворювань очей (кон'юнктивіти, кератити, кератокон'юнктивіти), і вух (катаральні та гнійні отити), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до ципрофлораксацину; з метою попередження запальних явищ очей і вух в передопераційний та післяопераційний періоди, ускладнень після перенесених травм, попадання сторонніх предметів.



Дозування

Препарат закапують в кон'юнктивальний мішок або слуховий прохід по 1–2 краплі 2–3 рази на добу.

Тривалість лікування зазвичай не перевищує 2–3 тижнів. Тривалість терапії визначають ефективністю препарату і ймовірністю розвитку побічних ефектів.

За наявності значного гнійного або слизисто-гнійного виділення, попередньо проводять антисептична обробку очей або вух.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

Не застосовувати препарат для лікування отиту в тварин з перфорацією барабанної перетинки.

Не застосовувати при вірусних та мікозних ураженнях очей і вух.

Не застосовувати одночасно з нестероїдними протизапальними препаратами, теофіліном.

Застереження

Побічна дія

За застосування препарату згідно з листівкою-вкладкою побічних явищ і ускладнень у тварин, як правило, не спостерігається. З боку органу зору рідко спостерігають алергічні реакції, відчуття жару після застосування препарату.

Особливі застереження при використанні

За підвищеної індивідуальної чутливості тварин до компонентів препарату і появи алергічних реакцій використання препарату слід припинити і за необхідності призначити тварині антигістамінні препарати і засоби симптоматичної терапії.

Перед застосуванням препарату рекомендується провести тест на чутливість бактерій, виділених від хворих тварин, до ципрофлоксацину. У разі відсутності даних щодо чутливості збудника/збудників до ципрофлоксацину застосування препарату слід базувати на регіональній епізоотичній ситуації з протимікробної чутливості.

Не застосовувати при вірусних та мікозних враженнях очей і вух.

З обережністю застосовувати тваринам до семиденного віку.

Краплі не призначені для застосування продуктивним тваринам.

Використання під час вагітності, лактації

З обережністю застосовувати вагітним тваринам.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Препарат не слід застосовувати одночасно з іншими препаратами для аурікулярного введення.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Під час роботи з краплями слід дотримуватися загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, передбачених при роботі з ветеринарними лікарськими засобами. Під час роботи забороняється палити, пити і приймати їжу. Після закінчення роботи руки слід вимити теплою водою з милом.

За випадкового контакту ветеринарного препарату зі шкірою або слизовими оболонками очей їх необхідно промити великою кількістю води. Людям з гіперчутливістю до компонентів препарату слід уникати прямого контакту з препаратом. У разі появи алергічних реакцій або при випадковому попаданні препарату в організм людини слід негайно звернутися в медичний заклад (при собі мати листівку-вкладку або етикетку).

Форма випуску

Флакони з полімерних матеріалів з крапельницями по 10 мл.

Вторинне пакування – картонні пачки.

Зберігання

Сухе темне недоступне для дітей місце за температури від 10 до 25°C.

Термін придатності – 3 роки.

Термін придатності після першого відкриття (відбору): 30 діб за умови зберігання у темному місці за температури від 2 до 8°C.

Лише для ветеринарної медицини.

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,

Бучанський р-н, Київська обл.,

08030, Україна

www.ukrzoovet.com.ua

