

С. 6. 0 5. 2026

ЦИПРОЛАК
(таблетки, вкриті плівковою оболонкою)
листівка-вкладка

Опис

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, білого або майже білого кольору, з двоопуклою поверхнею, без запаху, масою 0,15 та 0,5 г.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

ципрофлораксацину гідрохлорид у перерахунку на ципрофлораксацин - 100,0 мг.

Допоміжні речовини: лактоза, крохмаль кукурудзяний, целюлоза мікрокристалічна, лактулози сироп, кремнію діоксид колоїдний безводний, кальцію стеарат, гіпромелоза, титану двоокис, макрогол 6000, тальк.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QJ01- Антибактеріальні засоби для системного застосування. QJ01MA02 - Ципрофлораксацин.

Ципрофлораксацин – синтетичний антибактеріальний препарат групи фторхінолонів з широким спектром дії.

Ципрофлораксацин активний щодо грамнегативних (*E. coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Serratia spp.*, *Camphylobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Yersinia spp.*, *Vibrio spp.*, *Aeromonas spp.*, *Haemophilus spp.*, *Brucella spp.*, *Mycobacterium spp.*) та грампозитивних (*Staphylococcus spp.* (включаючи пеніциліназо-продукуючі та метицилін-стійкі штами) *Streptococcus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.* та інші) мікроорганізмів, а також до нього чутливі мікоплазми (*Mycoplasma spp.*) та хламідії (*Chlamydia trachomatis*).

Механізм дії ципрофлораксацину полягає в інгібуванні бактеріальної ДНК-гірази (топоізомерази II), що впливає на реплікацію спіралі ДНК та призводить до порушення синтезу білка і загибелі мікроорганізму.

Після перорального застосування ципрофлораксацин всмоктується переважно в дванадцятипалій і порожній кишці, біодоступність у собак становить 50–85%, у котів – 33%. Максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 60-90 хв. Об'єм розподілу – 2-3 л/кг. Зв'язування з білками плазми незначне (20-40%). Ципрофлораксацин добре проникає в органи та тканини (включаючи тканини, багаті жирами), кістки, плевру, очеревину, лімфу, очну рідину і плаценту. Приблизно через 2 години після перорального застосування він виявляється в тканинах і рідинах організму в концентраціях, що у багато разів перевищують його концентрацію в сироватці крові. Ципрофлораксацин метаболізується в печінці.

Період напіввиведення з плазми після перорального застосування становить від 3 до 5 годин. Ципрофлораксацин виводиться з організму переважно у незміненому вигляді та у вигляді метаболітів, менш активних, ніж сам ципрофлораксацин, головним чином нирками (50–70%). Значна кількість ципрофлораксацину виводиться також із жовчю та фекаліями (до 30%), у лактуючих тварин також і з молоком.

Застосування

Лікування собак та котів за хронічних і гострих захворювань органів дихання, травного каналу, сечостатевої системи, шкіри та м'яких тканин, кісток і суглобів, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до ципрофлораксацину.

Дозування

Дозування та кратність введення слід коригувати за необхідності для кожної тварини та кожного випадку індивідуально.

ЦИПРОЛАК таблетки застосовують тваринам індивідуально перорально з невеликою кількістю корму (ласощів) або вводять на корінь язика в дозах:

коти – 5 мг ципрофлораксацину на 1 кг маси тіла двічі на добу (через 12 годин) протягом 3-7 діб;

С.С. 05. 2026

собаки – 5-10 мг ципрофлоксацину на 1 кг маси тіла двічі на добу (через 12 годин) протягом 3-7 діб.

Одноразові дози препарату ЦИПРОЛАК залежно від маси тіла тварини та модифікації таблеток представлені в таблиці:

Маса тіла тварини (кг)	Кількість таблеток (одноразова доза)	
	ЦИПРОЛАК для котів і собак дрібних порід (15 мг ципрофлоксацину в таблетці)	ЦИПРОЛАК для собак (50 мг ципрофлоксацину в таблетці)
До 3 кг	1	-
>3-6	2	-
>6-10	3	1
>10-20	-	2
>20-30	-	3
>30-40	-	4
>40	1 таблетка «ЦИПРОЛАК таблетки для собак» (50 мг ципрофлоксацину) в таблетці на кожні додаткові 10 кг маси тіла тварини	

Курс лікування може бути відкорегований лікарем ветеринарної медицини залежно від перебігу захворювання, реакції на ліки та розвитку будь-яких побічних ефектів.

Котам препарат слід застосовувати з великою обережністю та під особливим контролем, оскільки це може викликати анорексію.

Протипоказання

Не застосовувати за підвищеної чутливості до компонентів препарату.

Не застосовувати тваринам із виражених порушень розвитку хрящової тканини, а також із тяжкою нирковою або печінковою недостатністю.

Не застосовувати тваринам з ураженнями нервової системи, що супроводжуються судомами.

Не застосовувати кошенятам молодше 8 місяців, цуценям молодше 12 місяців (цуценям великих порід - молодше 18 місяців).

Не застосовувати з профілактичною метою.

Не застосовувати у разі виявлення стійких штамів патогенних бактерій, резистентних до хінолонів.

Не застосовувати самкам в період вагітності та лактації.

Не застосовувати одночасно з тетрациклінами, макролідами, лінкозамідами, циклоспоринами, хлорамфеніколом та нестероїдними протизапальними засобами

Застереження

Побічна дія

Побічних явищ і ускладнень у собак і котів за застосування препарату відповідно до листівки-вкладки, як правило, не спостерігається.

У випадку підвищеної індивідуальної чутливості тварини до фторхінолонів і за появи ознак побічної дії (свербіж, нудота, блювання, тремор м'язів) використання препарату припиняють і проводять десенсибілізуючу терапію.

Може спричиняти проблеми у розвитку кісток/суглобів у молодих тварин, що ростуть, включаючи собак великих порід віком до 18 місяців.

Особливі застереження при використанні

Фторхінолони слід використовувати для лікування клінічних станів, за яких протимікробні засоби інших класів виявилися або можуть виявитися неефективними.

Препарат слід застосовувати лише з урахуванням результатів тестувань чутливості мікроорганізмів-збудників до ципрофлоксацину.

Не допускайте зневоднення тварин під час лікування цим препаратом через можливий ризик розвитку кристалурії.

С. 5. 0 5. 2026

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з тетрациклінами, макролідами, лінкозамідами, циклоспоринами, хлорамфеніколом та нестероїдними протизапальними засобами.

Препарати, що містять у своєму складі катіони Mg^{2+} , Al^{3+} , Ca^{2+} , у разі одночасного застосування із ципрофлоксацином знижують його біодоступність. У зв'язку з цим ципрофлоксацин слід застосовувати або за 2 години до, або принаймні через 4 години після прийому цих препаратів.

Під час одночасного застосування з теофіліном (еуфіліном), ципрофлоксацин може підвищити рівень теофіліну в крові.

За одночасного введення препарату із аміноглікозидами, цефалоспоринами третього покоління та пеніцилінами широкого спектру дії може виникнути синергізм по відношенню до деяких бактерій (*Pseudomonas aeruginosa* та бактерій родини *Enterobacteriaceae*).

Препарат не рекомендують змішувати з іншими лікарськими засобами.

Передозування

За передозування лікарського ветеринарного препарату у тварин може спостерігатися зниження апетиту, пригнічений стан, блювання. У цьому випадку слід припинити застосування препарату та призначити симптоматичне лікування. За необхідності можна застосувати антациди, що містять алюміній або магній, або активоване вугілля для зниження всмоктування ципрофлоксацину.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих під час роботи з ветеринарними препаратами. Особам із відомою гіперчутливістю до фторхінолонів слід уникати будь-якого контакту з продуктом. У разі випадкового проковтування негайно зверніться до лікаря та покажіть йому листівку-вкладку з упаковки. Вимийте руки після роботи з продуктом. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води.

Форма випуску

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, масою 0,15 і 0,50 г по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці.

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності - 4 роки.

Рекомендований відпуск за рецептом.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромстач»
вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка, Бучанський р-н.,
Київська обл., 08030, Україна.
www.ukrzoovet.com.ua