

Мелоксивет суспензія 10 мл: інструкція по застосуванню

Мелоксивет

суспензія для перорального застосування

Форма випуску

Полімерні флакони:

10 мл

50 мл

Укомплектовані шприцом-дозатором та вкладені в коробку.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

мелоксикам - 1 мг.

Фармакологічні властивості

Препарат належить до нестероїдних протизапальних лікарських засобів класу оксикамів, є селективним інгібітором ЦОГ-2. Виявляє протизапальну, анальгезуючу та жарознижувальну дії. Механізм дії пов'язаний зі зниженням біосинтезу простагландинів внаслідок пригнічення ферментативної активності ЦОГ-2, що бере участь у синтезі простагландинів в осередку запалення; незначно впливає на ЦОГ-1, що зменшує ризик розвитку побічної дії.

Застосування

Мелоксивет суспензію призначають собакам і котам як протизапальний, жарознижувачий і болезаспокійливий препарат при запальних і больових синдромах різного походження, включаючи гострі та хронічні захворювання опорно-рухового апарату (артрити, артрози, синовіти, вивихи), запальні захворювання м'яких тканин, а також в якості анальгезуючого і протизапального препарату в післяопераційний період.

Дозування

Мелоксивет суспензію застосовують під час годівлі індивідуально перорально один раз на добу.

Собакам в перший день лікування препарат застосовують у дозі 0,2 мл (4 краплі) препарату на 1 кг маси тіла тварини, в наступні дні - 0,1 мл (2 краплі) препарату на 1 кг маси тіла тварини.

Котам препарат застосовують у перший день лікування у дозі 0,1 мл (2 краплі) препарату на 1 кг маси тіла тварини, в наступні дні - 0,05 мл (1 крапля) препарату на 1 кг маси тіла тварини. Перед застосуванням вміст флакону з препаратом необхідно підігріти до 30°C та струсити.

Тривалість курсу лікування залежить від показань і стану тварини, але не повинна перевищувати 10 днів.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість тварини до мелоксикаму; виразка шлунку і 12-палої кишки, виражена ниркова і печінкова недостатність, геморагічний синдром. Не застосовувати одночасно із глюкокортикостероїдами, іншими нестероїдними протизапальними препаратами, а також антикоагулянтами.

Не застосовувати вагітним і лактуючим самкам, цуценят і кошенят молодше 6-тижневого віку, тваринам у стані дегідратації, гіповолемії і гіпотензії через можливість токсичного впливу лікарського

препарату на нирки. Препарат протипоказаний тваринам із захворюваннями серцево-судинної системи.

Застереження

Призначати якомога коротшим періодом застосування та у мінімальній ефективній добовій дозі. У разі розвитку ознак побічної дії застосування препарату слід припинити.

Зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі від 0 до 25°C.

Термін придатності - 2 роки. Термін придатності після першого відкриття - не більше 3 місяців.

При зберіганні допускається випадання осаду.

petnöhöuse