

Ветдерм спрей, 50 мл флакон

Склад

1 мл містить:

гідрокортизону ацепонат — 0,584 мг

Опис

Розчин безбарвний або світло-жовтого кольору, прозорий, з характерним запахом ефіру.

Фармакологічні властивості

Гідрокортизон — дермакортикоїд із класу діефірів глюкокортикостероїдів. Має потужну глюкокортикоїдну, протизапальну, протинабрякову та протиалергічну дію. Гальмує реакції гіперчутливості, проліферативні та ексудативні процеси в сполучній тканині вогнища запалення. Зменшує місцеву гіперемію і гіпертермію шкіри. Діє опосередковано через специфічні внутрішньоклітинні рецептори. Запобігає активації фосфоліпази A2, стимулюючи утворення її інгібітора — ліпомодуліну. У результаті прямого впливу на клітинні мембрани порушує синтез простагландинів і виділення макрофагального хемотаксичного фактору та інгібує активацію тканинних кінінів. Зменшує міграцію макрофагів і лімфоцитів у вогнище запалення. Блокує Fc-рецептори на поверхні макрофагів для IgG і C3 компоненту комплементу. Стабілізує мембрани лізосом, запобігаючи виділенню лізосомальних ферментів. Пригнічує альтерацію, ексудацію та проліферацію. У великих дозах гальмує розвиток лімфоїдної та сполучної тканин, знижує активність гіалуронідази й проникність капілярів. Уповільнює продукування колагенази та прискорює синтез інгібіторів протеаз. Блокує синтез і вивільнення з сенсibilізованих опасистих клітин (мастоцитів) і базофілів гістаміну та інших біологічно активних речовин, пригнічує різні стадії імуногенезу, не виявляючи мітостатичної дії.

Гідрокортизон належить до класу діефірів глюкокортикостероїдів, які є ліпофільними компонентами, що швидко абсорбуються з поверхні шкіри, глибоко проникають і накопичуються в ній. При низьких дозах гідрокортизон має місцеву протизапальну дію на епідерміс та поверхневі шари дерми. Виводиться з організму із сечею та калом. За ступенем впливу на організм гідрокортизон ацепонат належить до малонебезпечних речовин, у рекомендованих дозах не чинить подразнювальної та сенсibilізуючої дії.

Показання

Симптоматичне лікування собак при запальних та алергічних дерматозах.

Протипоказання

Не призначати тваринам із підвищеною чутливістю до діючої речовини препарату, виразками та ранами на шкірі, при дерматитах бактеріальної, грибової та вірусної етіології.

Не застосовувати котам.

Спосіб застосування та дози

Препарат використовують для зовнішньої обробки ураженої шкіри шляхом розпилення розчину на пошкоджені місця. Обробку проводять на відкритому повітрі або в провітрюваному приміщенні.

Вміст флакона розпилюють з відстані 10 см. Рекомендована доза — 1,52 мкг гідрокортизону ацепонату на 1 см² ураженої шкіри на добу (три натискання на дозатор для обробки ділянки 10 × 10 см). Курс лікування — 7 днів.

Втирати препарат в шкіру непотрібно.

Якщо після тижня лікування покращень немає, лікар ветеринарної медицини повинен переглянути призначення.

Застереження

Уникати потрапляння засобу на слизові оболонки та в очі тварини.

Не пропускати обробки, оскільки це призводить до зниження терапевтичного ефекту.

Клінічні ознаки атопічного дерматиту (свербіж і запалення шкіри) є неспецифічними для цього захворювання, тому перед початком лікування слід встановити справжню причину дерматиту. Нею можуть бути ектопаразитарні інвазії та інфекції. За їх наявності собака має отримати відповідне лікування.

Через відсутність даних щодо використання препарату при синдромі Кушинга у таких випадках його призначають після оцінки лікарем ветеринарної медицини ризику та користі для здоров'я тварини. Оскільки глюкокортикостероїди уповільнюють ріст, молодим тваринам (віком до 7 місяців) їх застосовують також після оцінки ризику та користі для їхнього здоров'я й під постійним наглядом за клінічним станом.

Обробляти можна не більше 1/3 поверхні тіла собаки.

Безпечність використання під час вагітності та лактації не встановлена. Але оскільки системна абсорбція гідрокортизону є незначною, то тератогенний та фетотоксичний вплив препарату є малоймовірним, якщо його застосовують у рекомендованих дозах.

Застосовувати засіб вагітним та лактуючим тваринам можна тільки коли ефект від нього перевищить можливі негативні наслідки (це оцінює лікар ветеринарної медицини). Дозволяється застосовувати разом з іншими лікарськими препаратами етіотропної і патогенетичної терапії. Використовувати одночасно інші засоби місцевої дії не рекомендується.

При нанесенні препарату дотримуватись правил поводження з ветеринарними засобами. Не допускати потрапляння на шкіру та в очі, не вдихати пари препарату.

Після обробки ретельно вимити руки.

Засіб вогнебезпечний, тому не можна розпилювати його біля відкритого вогню та розжарених приладів, а також палити під час роботи з ним. Використовувати у добре провітрюваних приміщеннях.

Умови зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці за температури від +5 до +25 °С.

Після відкриття флакона препарат використати протягом 42 діб.

Термін придатності

2 роки.

ЕФЕКТИВНЕ ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНИХ ДЕРМАТИТІВ У ТВАРИН: ЗАСТОСУВАННЯ ВЕТДЕРМ СПРЕЮ

Шкірні захворювання у собак і котів — поширена проблема, яка потребує спеціалізованого підходу.

Причинами таких захворювань можуть бути:

алергії (на їжу, бліх, атопія);

інфекції (бактеріальні або грибкові);

внутрішні захворювання, що проявляються змінами на шкірі.

Часто для усунення алергічних симптомів, запалень шкіри та інших дерматологічних проблем використовують кортикостероїди. Вони пригнічують практично всі компоненти запального процесу: знижують активність фосфоліпази A2, зменшують синтез інтерлейкінів та інших медіаторів запалення, ослаблюють клітинний імунітет, уповільнюють синтез комплементу та активність лейкоцитів.

Але дерматологічні захворювання потребують комплексного підходу і використання топікальних, або місцевих засобів для лікування шкіри, очей та вух, а також системних препаратів у вигляді оральних та ін'єкційних розчинів для загального впливу на організм.

БРОВАФАРМА пропонує два засоби для комплексної терапії дерматитів:

Ветдерм спрей на основі гідрокортизону ацепонату для місцевого лікування;

Суспензію для перорального застосування Ветдерм для системної терапії.

Ветдерм спрей призначений для лікування алергій та запалень шкіри у собак і котів.

Діюча речовина — гідрокортизону ацепонат, зв'язується з рецепторами, що сприймають подразники на поверхні клітин, і блокує їх. У результаті активність речовин, які діють як подразники та активатори запалення, знижується. Як будь-який кортикостероїд, Ветдерм спрей має певні переваги, але потребує й обережності.

Переваги використання кортикостероїдів:

зменшують запалення шкіри і полегшують симптоми алергій;

швидко заспокоюють свербіж, почервоніння і прибирають набряки.

Тривале використання кортикостероїдів може викликати:

побічні ефекти — зниження активності імунної системи, збільшення ваги та інші; залежність від препарату.

Як засіб для місцевого застосування Ветдерм спрей:

діє безпосередньо на уражені ділянки;

зменшує запалення та свербіж, блокуючи медіатори запалення;

не потрапляє в кровообіг, тому ризик виникнення побічних ефектів незначний.

Кортикостероїди є важливим інструментом у лікуванні шкірних захворювань у собак і котів. Проте їх використання повинно бути обґрунтоване і контролюватися лікарем ветеринарної медицини. Завжди консультуйтеся зі спеціалістом перед застосуванням будь-яких медикаментів для вашого улюбленця, щоб досягнути оптимальних результатів лікування та зберегти його здоров'я.